

## 第2類医薬品

花粉、ハウスダスト等による目のアレルギー症状に

# NEWエージーズクール

クロモグリク酸ナトリウム配合点眼薬

## NEWエージーズクールの特徴

1. 抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」を配合した「アレルギー専用」点眼薬です。
2. 「クロモグリク酸ナトリウム (抗アレルギー剤)」が肥満細胞膜を安定化し、目のかゆみ・目の充血等のアレルギー症状を引き起こす誘発物質 (ヒスタミン等) の放出を抑制します。
3. 「クロルフェニラミンマレイン酸塩 (抗ヒスタミン剤)」がヒスタミンの受容体結合をブロックし、すでに起きてしまった症状を緩和します。
4. 角膜保護成分である「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」が潤いを保持して角膜表面をいたわります。
5. 添加物として「ヒアルロン酸Na (製剤の粘稠剤)」を配合しています。
6. 清涼感のある「クールなさし心地」の点眼薬です。


## NEWエージーズクールのはたらき



### クロモグリク酸ナトリウム

〈抗アレルギー剤〉

肥満細胞膜を安定化し、アレルギー症状を引き起こす誘発物質 (ヒスタミン等) の放出を抑制します。



### クロルフェニラミンマレイン酸塩

〈抗ヒスタミン剤〉

ヒスタミンの受容体結合をブロックし、すでに起きてしまった症状を緩和します。

### コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

〈角膜保護成分〉

潤いを保持して角膜表面をいたわります。

イメージ図



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと事故が起こりやすくなります)

点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気等があらわれることがあります)



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
  - (6) 次の診断を受けた人：緑内障
  - (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人  
特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談して下さい。
    - 片方の目だけに症状がある場合
    - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
    - 視力にも影響がある場合
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	目の充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 目のかすみが改善されない場合
  - (2) 2日間使用しても症状がよくなる場合
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果


花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような目のアレルギー症状の緩和：  
目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いとき等)、なみだ目、異物感  
(コロコロする感じ)

## 使用法

1回1～2滴、1日4～6回点眼して下さい。  
2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

### 〈使用法に関連する注意〉

- (1)使用法を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)コンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用にのみ使用して下さい。



## 成分・分量

本剤は、100mL中に次の成分を含有しています。

クロモグリク酸ナトリウム……………1g  
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.015g  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………0.2g  
添加物：エドト酸Na、等張化剤、ベンザルコニウム塩化物、ステアリン酸ポリオキシル、プロピレングリコール、グリセリン、dl-カンフル、d-ボルネオール、ヒアルロン酸Na

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
- (6)自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 03(5205)8331  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

C