

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

しみ、そばかすに

L-システイン配合

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

システィナC[®] cystinaC

特 徴

システィナCは、ビタミンCをはじめ、L-システインなどを配合したビタミン剤で、しみやそばかすによく効きます。

- ビタミンCとL-システインが協力して、しみ、そばかすの原因となるメラニンの生成をおさえます。
- ビタミンCが黒色メラニンの淡色化を促進します。
- ビタミンB₆が皮ふや粘膜の新陳代謝を促進し、パントテン酸カルシウムがビタミンCの働きを助けて効果を高めます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	悪心・嘔吐、腹痛

(2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
下痢

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
- 次の場合のビタミンCの補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
「ただし、上記1及び2の症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」

用法・用量

次の量を食前又は食後に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないで下さい	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成 分

成人1日量(6錠)中

成 分	含 量
L-システイン	240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	6mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物：セルロース、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、乳酸Ca、マクロゴール、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルナウバロウ

<成分に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。

医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。なお、服用のつどビンのフタをしっかりとめて下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) めれた手で取り扱わないで下さい(本剤は糖衣錠のため、水分が錠剤につくと、表面の糖衣が一部溶けて、変色又はむらを生じることがあります。)
- (5) ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っても服用しないよう注意して下さい。
- (6) ビンの中のつめものはフタをあけた後は取り除いて下さい。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。また、一度開封した後は、品質保持の点から6カ月以内に服用して下さい。
- (8) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入して下さい。

※本剤はL-システインを配合してありますので、多少特異なおいがあることもありますが、効果に変わりはありません。

※本剤は落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いにはご注意ください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03(5205)8331

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

システィナCについて詳しくは <http://www.cystina.com/>