

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

コレステロールが気になりだしたら…

第3類医薬品

血清高コレステロール改善薬

インゲオール[®]3

インゲオール3の特徴

- インゲオール3は血液中のコレステロールの代謝を促進するパンテチンに、コレステロールの吸収をおさえるソイステロール、および過酸化脂質（血管のサビ）をおさえるビタミンEを配合した脂質代謝の改善薬です。
- インゲオール3はコレステロールの高い方によくみられる末梢血行障害が原因の手足の冷え、しびれ等の自覚症状を緩和します。
- インゲオール3はのみやすいソフトカプセルです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢、軟便、便秘
4. 1カ月位服用してもコレステロール値の改善が見られない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1カ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をして下さい)
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

血清高コレステロールの改善

血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回 食後に服用して下さい。
15歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行って下さい。

成分・分量

本剤は、6カプセル中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
日本薬局方パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓においてコレステロールの代謝促進をはかり、血液中の余分なコレステロールを取り除きます。
大豆油不けん化物 (ソイステロール)	600mg	大豆からの抽出成分で、小腸におけるコレステロールの吸収を阻害し、排泄を促すはたらきがあります。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、血管に障害を与える過酸化脂質の生成をおさえ、血行を良くします。

添加物：ポリソルベート80、サフラワー油、ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、酸化チタン、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)ビンの中の詰め物は輸送中のカプセル破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (5)ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っても服用しないよう注意して下さい。
- (6)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

B5®登録商標

 販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10