

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

ノンステロイド 塗るかゆみどめ

マキロン[®]かゆみどめ液P

鎮痒消炎薬

マキロンかゆみどめ液Pの特徴

1. ベタつかない、スーッとしたい使いごちです。
2. 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールを配合しています。
3. ノンステロイドのかゆみどめ液です。



使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 傷のある患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能・効 果

虫さされ、かゆみ

使 用 法

1日1～数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

《 容器の使い方 》

容器を逆さまに持って、スポンジ面を数回患部に押しつけ、薬液をスポンジに充分浸透させて下さい。

1. 薬液がスポンジに充分浸透していないと、スポンジが破れることがありますのでご注意下さい。
2. 使用後はスポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかり閉めて下さい。



成 分・分 量

本剤は、無色透明な液剤で、100mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみをおさえます。
グリチルレチン酸	0.2g	皮膚の炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。
l-メントール	5.0g	清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル	0.1g	

添加物：1,3-ブチレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 車の中など、高温になる場所に放置しないで下さい。容器が変形し、中栓部分の脱落や液もれがおこるおそれがあります。
- (6) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

マキロンについて詳しくは www.makiron-s.jp

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
ホームページ <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168