

指定医薬部外品

www.regain.jp

販売名:リゲインX1

リゲイン相談ダイヤル 0120-488024

使用に際しては説明書きをよく読むこと。

■1本(100mL)中の成分■ ベンフォチアミン(ピオタミン:ビタミンB₁誘導体)5mg、ビタミンB₂リン酸エステル 5mg、ビタミンB₆ 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リパオール)

30mg、タウリン 1000mg、トウキエキス 24mg(当帰80mgに相当)、オウセイエキス 72.8mg(黄精240mgに相当)

●添加物:異性化糖、D-ソルビトール、ブドウ糖、アセスルファムK、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、5'-イノシン酸2Na、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、グルコン酸Ca、カラメル、香料、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、ビタミンE、ミツロウ、アルコール (アルコール0.1mL以下)

■効能・効果■ 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

使用期限

製造番号

リゲイン[®]X

肉体疲労時の栄養補給に

Regain

100mL



Daiichi-Sankyo

ビンは割れものですので、お取扱いにご注意下さい。

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造 田村薬品工業株式会社
販売元 奈良県御所市西寺田50

■用法・用量■ 成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。

〈用法・用量に関連する注意〉用法・
[®]用量を守ること(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。

使用上の注意 **相談すること** 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

1. 服用後、皮ふに発疹、消化器に胃部不快感、下痢の症状があらわれた場合 2. しばらく服用しても症状がよくなる場合

■保管及び取扱い上の注意■ 1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2. 小児の手の届かない所に保管すること。3. 生薬エキスを配合していますので、ときに沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振って服用して下さい。 ガラス:瓶 金属:キャップ 01[®]登録商標

