

● プロペト ピュアベール

【使用上の注意】

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【成分・分量に関する注意】

天然物(油性成分)を用いていますので、温度によりやわらかさが変わったり、溶けことがあります。

【解 説】

1.
 - (1) 共通事項解説[7]参照
 - (2) これらの部位に本剤を使用すると、症状が悪化するおそれがあります。
2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等が分かる外箱を持参の上、専門家に相談する必要があります。

やわらかさは外気温によっても影響を受け、夏は軟らかく、冬は硬くなる傾向があります。白色ワセリンは分子量の異なるパラフィンの混合物なので、融点が低いパラフィンは保管温度が高くなると液状となり、油分として出てくる場合があります。融点より低い温度になれば、元の状態に戻ります。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

- (1) 共通事項解説[8]参照
- (2) 共通事項解説[9]参照
- (3) 本剤が万一、目に入った場合、直ちに目を水又はぬるま湯で洗い流し、本剤を取り除いて下さい。また、水洗いしても刺激がいつまでも続いたり、涙が止まらない場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思ひぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

- (1) 共通事項解説[11]参照
30℃以下の涼しい場所での保管をおすすめします。
- (2) 共通事項解説[12]参照
- (3) 共通事項解説[13]参照
- (4) 共通事項解説[17]参照