

使用前请务必阅读本说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时随时取阅。

第2类医药品

缓解花粉、屋尘等造成的鼻部过敏症状

AG Allercut® C

含色甘酸钠的滴鼻药

AG Allercut C 的特点

1. 抗过敏剂“色甘酸钠”抑制过敏介质的释放，缓解难耐过敏症状。
2. “马来酸氯苯那敏”阻止引发过敏症状的组胺受体结合，抑制打喷嚏及鼻涕症状。
3. “盐酸萘甲唑啉”抑制鼻子黏膜肿胀与充血，迅速改善鼻塞症状。
4. “甘草酸二钾”，缓解因过敏带来的鼻部炎症。
5. “氯化十六烷吡啶单水合物”，通过杀菌作用抑制细菌繁殖，保持鼻腔内清洁。
6. 清凉爽快使用感的滴鼻药。

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止事项

(若不遵守可能会导致目前的症状恶化或容易产生副作用及事故)

1. 以下人群请勿使用。
曾因本剂或本剂所含成分而引发过敏症状者
2. 使用后请勿驾驶车辆或操作机械类。
(会产生嗜睡等情况)
3. 请勿长期连续使用。



咨询事项

1. 以下人群请在使用前咨询医师、药剂师或登录销售者。
 - (1)正在接受医师治疗者
 - (2)正接受脱敏疗法和过敏治疗的人群
 - (3)孕妇或有可能怀孕者
 - (4)曾对药物等产生过敏症状者
 - (5)被诊断出患有以下疾病者
高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺功能障碍、青光眼
 - (6)无法确定症状的诱因是否来自过敏反应者
2. 使用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止使用，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

| 相 关 部 位 | 症 状 |
|---------|-------------|
| 皮 肤 | 发疹、发红、发痒、肿胀 |
| 鼻 子 | 肿胀、刺痛感、流鼻血 |
| 精神神经系统 | 头痛 |

极少可能会引发下列严重症状。该情况下，请立刻接受医师诊疗。

| 症状名称 | 症 状 |
|-------------|--|
| 休克 (过敏性) | 使用后马上出现皮肤痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。 |

3. 使用3天左右后症状并无改善时，请停止使用本品，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。
4. 即使症状有所改善但使用期间超过2周时，请携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

功效

缓解花粉、屋尘（室内灰尘）等所造成的以下鼻部过敏症状：

鼻涕（鼻涕过多）、鼻塞、打喷嚏、头重（头部沉重）

用法及用量

| 年龄 | 1次用量 | 1天使用次数 |
|------------|-------------|------------------------|
| 成人（15岁或以上） | 向两鼻腔内各喷雾1次。 | 3至5次 （请间隔3小时或以上后使用） |
| 7岁或以上未满15岁 | | |
| 未 满 7 岁 | 请勿使用。 | |

〈用法及用量相关注意事项〉

- (1)请严格遵守用法及用量。
- (2)使用过量反而会引发鼻塞。
- (3)7岁或以上儿童使用时，请在监护人指导与监督的情况下使用。
- (4)请仅限使用于滴鼻。

1. 使用前请先将鼻子擤干净。
（擤鼻子时不要过于用力）
2. 取下蓝色盖子，如图所示拿好容器。
（初次使用本品时，请按压数次排出空气，直至药液喷雾）
3. 将喷头轻轻放入鼻腔，喷1次药液。
请用相同操作在另一侧鼻腔中喷雾。
4. 使用后请用干净的纸巾等擦拭喷头后，将盖子盖紧。



成分及含量

本剂为无色至浅黄色透明液体，每 100mL 中含有以下成分。

| 成分 | 含量 | 作用 |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|
| Sodium Cromoglicate | 1 g | 抑制过敏介质的释放，缓解难耐过敏症状。 |
| Chlorpheniramine Maleate | 0.25 g | 阻止引发过敏症状的组胺受体结合，抑制打喷嚏及鼻涕症状。 |
| Naphazoline Hydrochloride | 0.025 g | 抑制鼻子黏膜肿胀与充血，迅速改善鼻塞。 |
| Dipotassium Glycyrrhizinate | 0.3 g | 缓解过敏反应造成的鼻部炎症。 |
| Cetylpyridinium Chloride Hydrate | 0.05 g | 通过杀菌作用抑制细菌繁殖，清洁鼻腔。 |

添加剂：Edetate Sodium, Polysorbate 80, Glycerin, l-Menthol, Fragrance, Ethanol

〈成分及含量相关注意事项〉

本药剂含有酒精，有时会感到刺痛。

保管及使用上的注意事项

- (1)请将盖子盖好后保管于阳光直射不到的阴凉处。
- (2)请保管于儿童触及不到的地方。
- (3)请勿换装于其他容器。（可能导致误用或变质）
- (4)请勿与他人共用。
- (5)请勿使用已超过所标识的使用期限的产品。即使在使用期限内，开封后也请尽快使用。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。


第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10

电话号码：0120-337-336 受理时间：9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®注册商标

 销售商
第一三共医药保健株式会社
东京都中央区日本桥 3-14-10

生产销售商
Teika 制药株式会社
富山市荒川 1-3-27