

使用前請務必閱讀本說明書。
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

指定第 2 類醫藥品

舒緩花粉造成的鼻塞、鼻水、打噴嚏

AG Allercut[®] EXc 〈專用於季節性過敏〉

含 0.1% 丙酸倍氯米松 (類固醇) 之點鼻藥劑

AG Allercut EXc 〈專用於季節性過敏〉之特點

1. 「丙酸倍氯米松」擁有抗炎症與抗過敏作用，直接作用於鼻部黏膜，抑制花粉造成之鼻塞、鼻水及打噴嚏。
2. 早上使用效果持續到傍晚，傍晚使用則效果持續到早上。(通常 1 天使用 2 次時)
3. 舒適清涼使用感，滯留於患處不易滴流。
4. 採用可以從任何角度噴霧，可以使用到最後的噴霧容器。
5. 可同時與鼻炎用內服藥與點眼藥並用。



使用上注意事項



禁止事項 (若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)

1. 以下人群請勿使用。
 - (1) 被診斷出患有以下疾病者
全身性之真菌症、結核性疾病、高血壓、糖尿病、反復性鼻出血、氣喘、青光眼、感染症
 - (2) 鼻孔化膿 (由於毛根感染而蓄膿，同時出現疼痛或腫脹) 者
 - (3) 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
 - (4) 未滿 18 歲者
 - (5) 孕婦或有可能懷孕者
 - (6) 過去 1 年之內，曾累計使用類固醇點鼻藥超過 3 個月者
2. 本劑與其他類固醇點鼻藥的累計使用期間，在 1 年內請勿超過 3 個月以上。(若需使用 3 個月或以上時，有可能患有其他疾患，請諮詢耳鼻喉科專科醫師)
3. 使用完本品後請勿使用其他類固醇類點鼻藥劑。但醫師有開處方時，請遵循醫囑。



諮詢事項

1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 正在接受脫敏療法過敏治療者
 - (3) 頭部、額頭或臉頰等處有疼痛、出現黃色或綠色等鼻水者 (感染性鼻竇炎)
 - (4) 哺乳中者
 - (5) 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - (6) 不確定症狀是否起因於季節性過敏者
 - (7) 高齡者
 - (8) 患有肥厚性鼻炎^{*1} 或鼻痔 (鼻息肉)^{*2} 者
※1: 鼻子周圍有沉重感，出現少量粘液性或黃綠色的鼻水。
※2: 鼻塞、鼻音重、鼻腔深處有異物感。
 - (9) 接受長期或大量的全身性類固醇療法者
2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本品，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
鼻部	流鼻血、鼻腔中瘡痂、刺痛感、發癢、乾燥感、不適感、突然打噴嚏、嗅覺異常、化膿症狀 (毛孔感染引發的濃液積聚並出現腫痛)
咽喉	刺痛感、異物感、化膿症狀 (因感染、咽喉深處積聚白色濃液並出現腫痛)
皮膚	發疹、發紅、發癢、紅腫
精神神經系統	頭痛、頭暈
消化器官	嘔吐感、嘔吐、腹瀉、食慾不佳
其他	氣喘、眼睛疼痛、眼睛模糊、心悸、血壓上升

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

- 使用後頭部、額頭或臉頰等處有疼痛、鼻水呈黃色或綠色等，出現與通常不同之症狀時請立即停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。(有可能與其他疾患並發)
- 使用1週左右後(1天最多4次(噴霧8次))症狀並無改善時，請停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

功效

舒緩由於花粉造成之以下季節性過敏症狀：鼻塞、鼻水(鼻水過多)、打噴嚏

用法及用量

年齡	1次用量	1天使用次數
成人(18歲或以上)	向左右鼻腔內各噴霧1次	通常2次(早晚)
未滿18歲	請勿使用。	

1天最多可使用4次(8次噴霧)，但請保持3小時以上的使用間隔。

- 症狀有所改善時，請減少使用次數。
若症狀再次惡化時，可增加使用次數。
- 1年內累計使用期間，請勿超過3個月以上。

〈用法及用量相關之注意事項〉

- 本劑含有丙酸倍氯米松(類固醇)，若使用過量或以錯誤的方法使用可能會引起副作用，請嚴格遵守用法及用量。
- 僅限用於點鼻。
- 使用時感覺有異味，請漱口。

〈使用方法〉

<p>①</p>  <p>鼻腔 鼻孔</p> <p>鼻孔化膿者無法使用。</p>	<p>②</p>  <p>使用前請輕輕將鼻子擤乾淨。 (擤鼻子時不要用力過度)</p>	<p>③</p>  <p>噴頭 取下藍色蓋子</p> <p>摘下藍色蓋子，如圖所示拿起容器。 (首次使用本品時，按壓數次排出空氣，直到藥液噴出為止)</p>	<p>④</p>  <p>將噴嘴前端輕輕伸入鼻腔內，噴霧1次藥液。 另一邊的鼻腔也請重複同樣的操作。</p>	<p>⑤</p>  <p>使用後請用潔淨的紙巾等將噴嘴周圍擦拭乾淨，然後將蓋子蓋緊。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〈使用上注意事項〉(1)請在使用前將鼻子擤乾淨，保持鼻腔暢通。

- 若容器前端接觸到鼻水等，會使藥液污染，敬請注意。
- 噴霧時，請注意不要把噴嘴朝向鼻中隔※，要保持噴嘴直插入鼻腔內。
右撇子容易使噴嘴朝右側的鼻中隔，左撇子容易使噴嘴朝左側的鼻中隔，敬請注意。
※鼻中隔：鼻孔中將鼻腔隔成左右的隔板
- 使用後請用紙巾等擦拭噴嘴周圍，保持清潔。
- 請勿用針頭等捅刺噴嘴前端，若針頭折斷時非常危險。

成分及含量

本藥劑為白色懸濁性粘稠液體，每100g中含有以下成分。

成分	含量	作用
Beclomethasone Dipropionate	0.1 g	作用於鼻黏膜，抑制鼻塞、鼻水等症狀。

添加物：Carboxyvinyl Polymer, L-Arginine, Ethanol, Tonicity Agent, Benzalkonium Chloride, Edetate Sodium, Mentha Oil, l-Menthol, Polysorbate 80, pH adjuster

〈成分及含量相關之注意事項〉本品含有酒精，可能會感到刺痛。

保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊蓋子後保管於陽光直射不到的陰涼處。
- 請保管於兒童觸及不到的地方。

(3)請不要移至其他容器。(會導致誤用或變質)

(4)請勿與他人共用。

(5)請勿使用已超過所標識之使用期限的產品。另外，即使在使用期限內，開封後，也盡量快速用完。

有關本品資訊，請向所採購之店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00 ~ 17:00 (週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

03®註冊商標



銷售商
第一三共醫療保健株式會社
Daiichi-Sankyo 東京都中央區日本橋 3-14-10

製造銷售商
東興藥品工業株式會社
富山縣中新川郡立山町辻 20