

清洗眼中花粉、屋尘等 清洁取下隐形眼镜后的眼睛

AG Allercut® Fresh Eye

第3类医药品

使用前请务必阅读本包装盒上的说明书。
同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时随时取阅。

使用注意事项



咨询事项

1. 以下人群请在使用前咨询医师、药剂师或登录销售者。

- (1)正在接受医师治疗者
- (2)曾对药物等产生过过敏症状者
- (3)有以下症状者 眼部剧烈疼痛

2. 使用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止使用，并携带本包装盒，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀

成分及含量

每100mL中

Chlorpheniramine Maleate3mg
Dipotassium Glycyrrhizinate25mg
ε-Aminocaproic Acid150mg
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B₆)10mg
Taurine100mg

添加剂: Boric Acid, Sodium Borate, Edetate Sodium, Glycerin, Propylene Glycol, Polysorbate 80, Benzalkonium Chloride Concentrated Solution 50, l-Menthol, d-Camphor, d-borneol, pH adjuster

保管及使用上的注意事项

- (1)请密封保管于阳光直射不到的阴凉处。
- (2)请保管于儿童触及不到的地方。
- (3)请勿换装于其他容器。(可能导致误用或变质)
- (4)请勿与他人共用同一个洗眼杯。
- (5)请勿使用已超过所标识的使用期限的产品。

〈咨询窗口〉

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室
邮编103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10
电话号码: 0120-337-336
受理时间: 9:00~17:00
(周六、周日及节假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

MADE IN JAPAN



Daiichi-Sankyo

销售商
第一三共医药保健株式会社
东京都中央区日本桥 3-14-10

生产销售商
日东 Medic 株式会社
富山县富山市八尾町保内 1-14-1

功效

清洗眼睛，预防眼部疾患（游泳后、灰尘及汗水进入眼睛时等）

用法及用量

1天3至6次，每次使用5mL清洗眼睛。

〈洗眼方法〉

请将药液倒至附属的洗眼杯内侧刻线（5mL），并将洗眼杯紧紧按压在眼部。保持洗眼杯紧贴至眼部的同时，将头部后仰，以免液体流出。脸部向上，眨眼数次清洗眼睛。



请勿使用清洗完一侧眼睛的药液清洗另一侧。倒掉清洗后的药液，并用清水充分将洗眼杯冲洗干净后，再清洗另一侧。

〈用法及用量相关注意事项〉

- (1)请严格遵守用法及用量。
- (2)儿童使用时，请在监护人指导与监督的情况下使用。
- (3)请勿在佩戴隐形眼镜的情况下使用。
- (4)使用前后将洗眼杯用清水冲洗干净。
- (5)请勿使用浑浊的药液。
- (6)本产品仅限使用于清洗眼部。
- (7)请将眼部周围污渍或妆容卸除后使用。

副作用被害救济制度咨询窗口

独立行政法人医药品医疗器械综合机构
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
电话号码: 0120-149-931 (免费电话)

01®注册商标