

清洗眼部之花粉、室內灰塵等

清潔摘取隱形眼鏡後的眼睛

AG Allercut® Fresh Eye

第3類醫藥品

使用前請務必閱讀本包裝盒上之說明書。
同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

使用上注意事項



諮詢事項

- 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
 - 正在接受醫師治療者
 - 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - 有以下症狀者 眼部劇烈疼痛
- 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本品，並攜帶本包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

成分及含量

每 100mL 中

Chlorpheniramine Maleate3 mg
Dipotassium Glycyrrhizinate25 mg
ε-Aminocaproic Acid150 mg
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B₆)10 mg
Taurine100 mg

添加物：Boric Acid, Sodium Borate, Edetate Sodium, Glycerin, Propylene Glycol, Polysorbate 80, Benzalkonium Chloride Concentrated Solution 50, l-Menthol, d-Camphor, d-borneol, pH adjuster

保管及使用上的注意事項

- 請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。
- 請保管於兒童觸及不到的地方。
- 請不要移至其他容器。(會導致誤用或變質)
- 請勿與他人共用洗眼杯。
- 請勿使用已超過所標識之使用期限的產品。

〈諮詢窗口〉

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口
郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10
電話號碼 0120-337-336
受理時間 9:00~17:00 (週六、週日及節假日除外)

功效

洗淨眼睛，預防眼病(游泳後、灰塵或汗水進入眼睛時等)

用法及用量

1天3至6次、每次使用5mL清洗眼睛。

〈洗眼方法〉

將藥液倒入附屬的洗眼杯，至內側刻線(5mL)，並將洗眼杯按壓至眼部。保持洗眼杯按壓在眼部的同時，將頭部後仰，以免液體流出。臉部向上，眨眼數次清洗眼睛。



請勿用使用過的藥液，清洗另一只眼睛。丟棄藥液，用清水將洗眼杯充分沖洗乾淨，再清洗另一邊的眼睛。

〈用法及用量相關之注意事項〉

- 請嚴格遵守用法及用量。
- 兒童使用時，請在監護人之指導監督下使用。
- 請勿在佩戴隱形眼鏡之狀態下使用。
- 使用前後請用清水充分清洗洗眼杯。
- 請勿使用混濁的藥液。
- 本品僅限用於清洗眼睛。
- 請將眼睛周圍的髒污與妝容卸除後使用。

副作用被害救濟制度諮詢窗口

獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話號碼 0120-149-931 (免費通話)

<https://www.daichisankyo-hc.co.jp/>

MADE IN JAPAN

01®註冊商標



銷售商
第一三共醫療保健株式會社
東京都中央區日本橋 3-14-10

製造銷售商
日東 Medic 株式會社
富山縣富山市八尾町保內 1-14-1