

針對虛弱的胃部發揮效用 協助腸道回復到接近正常的狀態

日本製

第一三共胃腸藥プラス 錠劑

第一三共胃腸藥 Plus 錠劑

胃腸藥



第2類医薬品

效能與效果

- 胃脹、暴飲暴食、胸口堵塞感、食慾不振
- 胸口灼熱、胃痛、胃酸過多、胃部沉重感、胃部不適、打嗝
- 消化不良、促進消化、胃弱、胃部 / 腹部膨脹感
- 想吐 (反胃、宿醉 / 酒醉反胃、噁心)、嘔吐
- 整腸 (調整通便)、軟便、便秘



用法與用量 / 使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲以上	3 錠	3 次 請於飯後服用。
11 歲以上未滿 15 歲	2 錠	
未滿 11 歲	請勿服用。	

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 讓 11 歲以上的兒童使用時，須有家長在旁指導監督。

成分與份量

本劑為淡灰褐色～淡褐色的膜衣錠，具有特殊的氣味，每 9 錠中含有以下成分：

成分	份量
Taka-diastase N1	150 mg
Lipase AP12	60 mg
Lactobacillus sporegene (bulk powder of Lacbon)	60 mg
Magnesium aluminosilicate	735 mg
Synthetic hydrotalcite	600 mg
Precipitated calcium carbonate	420 mg
Powdered phellodendron bark	105 mg
Powdered cinnamon bark	225 mg
Powdered ginger	75 mg
Powdered clove	30 mg
Powdered fennel	60 mg
<i>l</i> -menthol	9 mg
Aldioxa	60 mg
Powdered glycyrrhiza	150 mg

添加物：CMC, Japanese pepper, magnesium stearate

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 以下情形者請勿服用。
正在接受透析治療的人
2. 請勿長期連續服用。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (3) 被診斷出患有以下疾病的人
腎臟病、甲狀腺功能紊亂