

LOXONIN® EX 塗液

LOXONIN EX 塗液之特點

配有消炎止痛效果良好之成分 [洛索洛芬鈉水合物] 。

- 另外配有 L-薄荷醇。直接滲透至難耐疼痛深處發揮良好效果。
- 速乾性，舒適使用感之清涼型藥劑。氣味小。
- 方便塗抹於廣範圍患處不沾手，無色透明狀液體藥劑。



使用上注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)

1. 以下人群請勿使用。

- (1) 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
- (2) 曾因本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、外用鎮痛消炎藥而引起過氣喘者
- (3) 未滿 15 歲的兒童

2. 請勿使用於以下部位。

- (1) 眼睛周圍、黏膜等
- (2) 皮膚中較敏感之部位 (面部、腋下等)
- (3) 濕疹、斑疹、傷口處
- (4) 腳癬、頑癬等或化膿患處

3. 使用本劑期間，請勿使用其他任何外用鎮痛消炎藥。

4. 請勿連續使用 2 週或以上。

(本劑可一時舒緩疼痛。若疼痛等症狀持續時，請停止使用本劑，接受醫師診療)



諮詢事項

1. 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 曾對藥物等產生過敏症狀者
- (3) 孕婦或有可能懷孕者
- (4) 高齡者
- (5) 被診斷出患有以下疾病者 支氣管哮喘

2. 使用後出現以下症狀時可能為副作用。此情形時，請立即停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、斑疹、水皰、色素沉著
消化器官	胃部不適感、胸口疼痛
其他	浮腫

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 使用後，可能會出現下列症狀之情形，此症狀情形持續或變嚴重時請停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

- 腹瀉、軟便
4. 使用 5 至 6 天後症狀並無改善時，請停止使用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。(有可能患有其他疾患)

功效

腰痛、伴隨肩膀痠痛的肩膀痛、關節痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手、手腕的疼痛）、手肘痛（網球肘等）、撞傷、扭傷

用法及用量

1天3至4次，適量塗抹於患處。

〈用法及用量相關之注意事項〉

- (1)請嚴格遵守用法及用量。
- (2)請勿將保鮮膜等不透氣之材質包裹於塗抹本劑之部位。
- (3)本劑並非為根治疼痛及腫脹之病源，僅為舒緩疼痛及腫脹等症狀之藥劑，因此僅限於出現症狀時使用。
- (4)請遵守用量，1次用量不要超過約2g(塗抹面積：約10個手掌大小)，1週用量不要超過50g。
- (5)請注意不要使藥劑進入眼睛。若不慎進入眼睛，請立即用涼水或溫水清洗。若症狀嚴重時應前往眼科就診。
- (6)本藥劑僅限於外用。

《容器之使用方法》

讓塗抹海綿向下數次慢慢按向患處，使藥液充分滲透後使用。

- 1.若藥液未能充分滲透於塗抹海綿上，則易蹭破塗抹海綿，敬請注意。
- 2.使用後為防止海綿墊乾燥，請務必將蓋子蓋緊。



成分及含量

本劑為無色至微黃色透明液體藥劑，每100g中含有以下成分。

成分	含量	作用
Loxoprofen sodium hydrate	1.13 g (按無水物計算為1g)	抑制炎症及疼痛之根源【前列腺素】。
l-menthol	3 g	賦予清涼感，舒緩疼痛。

添加物：1,3-butylene glycol, hypromellose, phosphoric acid, disodium phosphate, ethanol

〈成分及含量之有關注意事項〉

本劑含有酒精，使用時偶爾皮膚會有刺痛感。

保管及使用上的注意事項

- (1)請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2)請保管於兒童拿不到的地方。
- (3)請不要移至其他容器中。(會導致誤用或變質)
- (4)請勿存放於明火附近。
- (5)本劑會使化學纖維、塑料類、塗漆面等溶化，請勿使其附著在地板、家具、眼鏡等物品上。
- (6)請勿使用已超過所標識的使用期限之產品。另外，打開包裝後請盡快使用。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10

電話號碼 0120-337-336 受理時間 9:00~17:00(週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®註冊商標



Daichi-Sankyo

製造銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10