

迅速舒缓疼痛
ロキソニンS

LOXONIN S

日本药典配方 洛索洛芬钠药片

迅速舒缓+呵护胃黏膜成分
ロキソニンSプラス

LOXONIN S plus

迅速舒缓+保护胃黏膜成分
ロキソニンS クイック

LOXONIN S QUICK

迅速舒缓难耐疼痛+保护胃黏膜成分
ロキソニンS プレミアム

LOXONIN S PREMIUM

速效+考虑到月经痛的发生机制
ロキソニンS
プレミアムファイン

LOXONIN S PREMIUM fine

产品名称	LOXONIN S	LOXONIN S plus	LOXONIN S QUICK	产品名称	LOXONIN S PREMIUM	LOXONIN S PREMIUM fine
成分与含量(每1片)	洛索洛芬钠水合物 (按无水物计算为 60 mg) 68.1 mg	洛索洛芬钠水合物 (按无水物计算为 60 mg) 68.1 mg 氧化镁 33.3 mg	洛索洛芬钠水合物 (按无水物计算为 60 mg) 68.1 mg 硅酸镁铝 100 mg	成分与含量(每2片)	洛索洛芬钠水合物 (按无水物计算为 60 mg) 68.1 mg 丙哌嗪 60 mg 无水咖啡因 50 mg 硅酸镁铝 100 mg	洛索洛芬钠水合物 (按无水物计算为 60 mg) 68.1 mg 芍药干馏提取物 36 mg (按原生药计算为 252 mg) 覆盆子 30 mg 硅酸镁铝 100 mg
医药品分类	第1类医药品	第1类医药品	第1类医药品	医药品分类	第1类医药品	第1类医药品

本药剂有什么效果？

- 本药剂属于非甾体类消炎镇痛药品（NSAIDs）类群的解热镇痛药。
- 本药剂可抑制产生疼痛、炎症、发烧根源的“前列腺素”，舒缓疼痛、退烧。
- 可以根据下列目的服用本药剂。
 - 头痛、月经痛（生理痛）、牙痛、拔牙后的疼痛、咽喉疼痛、腰痛、关节痛、神经痛、肌肉痛、肩膀酸痛、耳痛、撞伤痛、骨折痛、扭伤痛、外伤痛的镇痛。
 - 恶寒、发烧时的解热

购买本药剂之前需确认什么？

- 请参照以下项目，确认是否可以服用本剂。
- 副作用（因药剂引起的有害反应），有研究表明有可能会诱发胃溃疡、十二指肠溃疡、重度气喘的发作，引起皮疹、浮肿等。
- 详见【服用本药剂期间需注意什么？】。

下述人群请勿服用本药剂

- 曾因本剂或本剂所含成分而引发过过敏症状者
- 曾因服用本剂或其他解热镇痛药、感冒药而引起过气喘者

【曾服用含有洛索洛芬钠水合物、阿司匹林（乙酰水杨酸）、乙酰水杨酸铝、乙氧基苯酰胺、异布洛芬、乙酰胺酚以及异丙基安替比林配方的解热镇痛药及感冒药而引起过气喘者】
- 未满15岁的儿童
- 在医疗机构接受以下治疗者
 - 胃溃疡、十二指肠溃疡
 - 肝脏病
 - 肾脏病
 - 心脏病
- 曾被医师告知患有以下血液异常（血液疾患）者
 - 红血球数偏少（贫血）
 - 血小板数偏少（容易血流不止、容易出血）
 - 白血球数偏少
- 产前期在12周以内的孕妇

下述人群在服用本药剂时需注意。
购买前请咨询医师、牙科医师或药剂师。

- 正在接受医师或牙科医师治疗者
- 孕妇（不包括产前期在12周以内的孕妇）或有可能怀孕者
- 哺乳期妇女
- 高龄者（65岁或以上）
- 曾对药物等产生过过敏症状者
- 被诊断出患有以下疾病者
 - 支气管哮喘
 - 溃疡性大肠炎
 - 克罗恩氏病
 - 全身性红斑狼疮
 - 混合型结缔组织疾病
- 曾患有以下疾病者
 - 胃溃疡、十二指肠溃疡
 - 肝脏病
 - 肾脏病
 - 血液疾患

服用本药剂时需确认什么？

- 本剂并非治愈造成疼痛及发热等症状的疾病本身，而是舒缓所出现的症状。因此**请仅在出现症状时服用。**
- 服用1至2次后症状并无改善时，有可能患有其他疾患，此时请停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师、牙科医师或药剂师。
- **请勿长期连续服用。**（服用3~5天后，疼痛等症状仍反复出现时，请停止服用，并接受医师诊疗）
- 服用本剂的期间，请勿服用以下任何医药品。其他含有阿司匹林（乙酰水杨酸）、乙酰水杨酸铝、乙氧基苯酰胺、异布洛芬、乙酰胺酚以及异丙基安替比林配方的解热镇痛药、感冒药及含有丙烯异丙乙酸尿素、溴化缬草酸的镇静药、**晕车药【仅限于LOXONIN S PREMIUM】**
- **服用后，请勿驾驶操作交通工具或机械类。**（可能出现嗜睡等情况。）【仅限于LOXONIN S PREMIUM】
- 服用前后请勿饮酒。【摄取酒精时请勿服用本药剂。】

如何使用本药剂？

- **服用量及服用次数** 成人（15岁或以上）在出现症状时，请依照下述用量，尽量避免空腹时，用冷水或温水送服。通常**1天最多服用2次**。**若再次出现疼痛等症状时**，可服用第3次。请确保4小时或以上的服药间隔。

LOXONIN S	LOXONIN S plus	LOXONIN S QUICK	LOXONIN S PREMIUM	LOXONIN S PREMIUM fine
每次1片	每次1片	每次1片	每次2片	每次2片

※服用前请务必阅读附属在內的说明书，并遵守用法用量正确使用。

- 如何服用？
请用1杯白水或温水送服。
- 服用量过多时（过量摄取时）的因应方式
误将药剂过量服用时，请咨询医师或药剂师。

服用本药剂期间需注意什么？

- 服用类似于本药剂的解热镇痛药之后，会出现体温过度下降、虚脱（乏力）、四肢冰冷（手脚冰冷）等症状。出现此类症状时，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师或药剂师。
- 服药后若出现消化性溃疡（腹胀、胸口灼热、后背疼痛）、浮肿等情形，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师或药剂师。另外，偶尔会发生消化道出血（出现吐血、恶心及呕吐、腹痛、黑色粘稠的粪便、血便等症状）、消化道穿孔（消化道开孔。出现恶心及呕吐、剧烈腹痛等症状）、小肠及大肠狭窄、梗阻（出现恶心及呕吐、腹痛、腹部膨胀等症状）等严重症状。该情况下，请立刻接受医师诊疗。

是否有副作用？

(1) 服用后出现以下症状时可能为副作用。此情形时，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒
消化器官	腹痛、胃部不适感、食欲不振、恶心及呕吐、腹部膨胀、胸口灼热、口内炎、消化不良
循环器官	血压上升、心悸
精神神经系统	睡意、酸麻、头晕、头痛
其他	胸痛、倦怠感、脸部发烫、发烧、贫血、血尿

(2) 偶尔会发生特别需要注意的副作用，这里记载有各主要自觉症状。副作用的情况，各副作用所记载的主要自觉症状中，数个症状同时出现的情况较为常见。此情况时，请立即停止服用本剂，接受医师诊疗。

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后马上出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
血液障碍	出现咽喉疼痛、发烧、全身倦怠、脸部及眼皮内侧泛白、易出血（牙龈出血、鼻血等）、淤青（按压后也不会褪色）等症状。
史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、多形性红斑、急性泛发性发疹性脓疱病	发高烧、眼睛充血、眼屎、嘴唇溃烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹或发红、水泡出现在皮肤的红色部位、发红的皮肤上出现小疙瘩（小脓包）、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。
肾功能障碍	出现发烧、发疹、尿量减少、全身浮肿、全身倦怠、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
郁血性心脏衰竭	出现全身倦怠、心悸、气短、胸部不适感、胸痛、头晕、昏厥等症状。
间质性肺炎	爬楼梯或活动稍微过量时，就会突然出现气短·呼吸困难、干咳、发烧等，或者持续这些症状。
肝功能障碍	出现发烧、发疹、发痒、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等症状。
横纹肌溶解症	手脚、肩膀、腰等的肌肉疼痛、手脚酸麻、无力、僵硬、全身倦怠、红褐色尿等。
无菌性脑膜炎	出现伴随脖子抽筋的剧烈头痛、发烧、恶心·呕吐等。（尤其在接受全身性红斑狼疮或混合型结缔组织疾病治疗者当中，通报有大多数此类症状。）
气喘	呼吸时发出呼呼声、咻咻声，出现呼吸困难等。

将上述【服用本剂期间需注意什么？】中所示的自觉症状按照症状所出现的部位排列如下。发现这些症状时，请参考上述(2)特别需要注意的副作用的表格。

部位	自觉症状
全身	体温低于正常体温、乏力、全身浮肿、身体浮肿、发烧、全身倦怠、高烧、嗜睡、肌肉紧绷
头部	头晕、伴随脖子抽筋的剧烈头痛、头痛、晕倒
脸部	脸色苍白、鼻血、发烫
眼睛	眼皮内侧泛白、眼白变黄、眼睛充血、眼屎
耳朵	耳鸣
口腔及咽喉	吐血、咽喉疼痛、牙龈出血、恶心、呕吐、干咳（没有痰的咳嗽）、口内炎、唇部及口腔内溃烂、声音沙哑、打喷嚏、咽喉痒
胸部	胸口灼热、呼吸困难、心悸、气短、胸部不适感、胸痛、难以呼吸、气喘呼吸时发出呼呼声、咻咻声。
腹部	腹胀、腹痛、胃部不适感、食欲不振、膨胀感、消化不良、剧烈腹痛
后背	后背疼痛、肩部及腰部的肌肉痛
手、脚	手脚冰凉、酸麻、关节痛（各关节疼痛）、肌肉痛
皮肤	荨麻疹、起青斑、发疹、发红、广范围发疹或发红、水泡出现在皮肤的红色部位、皮肤变黄、发痒

便	黑色粘稠的粪便、有血的粪便、腹泻
尿	排尿量减少、血尿、褐色的尿、红褐色的尿
其他	血压容易上升、容易出血

(3) 服用后，可能会出现下列症状的情况，此症状持续或变严重时请停止服用本剂，并携带此说明书，咨询医师或药剂师。

口干、便秘、腹泻

本药剂中含有什么成分？

LOXONIN S

有效成分	每1片 Loxoprofen sodium hydrate (按无水物计算为 60 mg)	68.1 mg
添加物	hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, lactose monohydrate, red ferric oxide	

根据片剂会有因添加物造成的红色斑点

LOXONIN S plus

有效成分	每1片 Loxoprofen sodium hydrate (按无水物计算为 60 mg)	68.1 mg
	Magnesium oxide	33.3 mg
添加物	lactose, cellulose, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium, calcium stearate, hypromellose, titanium oxide, red ferric oxide, carnauba wax	

LOXONIN S QUICK

有效成分	每1片 Loxoprofen sodium hydrate (按无水物计算为 60 mg)	68.1 mg
	Magnesium aluminometasilicate	100 mg
添加物	anhydrous dibasic calcium phosphate, lactose, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, magnesium stearate	

LOXONIN S PREMIUM

有效成分	每2片 Loxoprofen sodium hydrate (按无水物计算为 60 mg)	68.1 mg
	Allylisopropylacetylurea	60 mg
	Anhydrous caffeine	50 mg
	Magnesium aluminometasilicate	100 mg
添加物	lactose, cellulose, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, talc, red ferric oxide, carnauba wax	

LOXONIN S PREMIUM fine

有效成分	每2片 Loxoprofen sodium hydrate (按无水物计算为 60 mg)	68.1 mg
	Paeonia dry extract (按原生药计算为 252 mg)	36 mg
	Hesperidin	30 mg
	Magnesium aluminometasilicate	100 mg
添加物	D-Mannitol, cellulose, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, macrogol, red ferric oxide, carnauba wax	

其他

- 如何保管本药剂？
 - 请保管于阳光直射不到（湿气少）的阴凉处。
 - 请保管于儿童拿不到的地方。
 - 请勿换装于其他容器（可能导致误用或变质）。

[LOXONIN S、LOXONIN S QUICK]

- 请勿使用超过所标示的使用期限的产品。

[LOXONIN S plus、LOXONIN S PREMIUM、LOXONIN S PREMIUM fine]

- 请勿使用超过所标示的使用期限的产品。
 - 另外，请在打开铝包装袋后12个月或以内使用。
- 请在包装盒的“开封年月日”填写栏中，填写打开铝包装袋的日期。

有关本药剂的咨询窗口在哪里？

- 有关常见疑问，请向下述窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社

(<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>)

顾客咨询室

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

电话号码：0120-337-336

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日以及公司假日除外）

- 有关症状、副作用等更加详细疑问，请咨询医师、牙科医师或药剂师。