

使用前請務必閱讀本包裝盒上之說明書。同時應對此說明書進行妥善保管，以便在必要時隨時取閱。

鎮痛消炎藥 第2類醫藥品 7片裝  
LOXONIN®S 貼布 (7片x1袋)

特點

配有消炎止痛效果良好之成分 [洛索洛芬鈉水合物]。

被皮膚吸收後成分活性化，  
直接滲透至難耐疼痛深處發揮良好效果。

1天使用1次。貼敷感舒適，  
伸縮性良好不易脫落，方便重新貼敷。



### 使用上注意事項

#### 禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化或容易產生副作用)

- 以下人群請勿使用。
  - 曾因本劑或本劑所含成分而引發過敏症狀者
  - 曾因本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、外用鎮痛消炎藥而引起過氣喘者
  - 未滿15歲的兒童
- 請勿使用於以下部位。
  - 眼睛周圍、黏膜等
  - 濕疹、斑疹、傷口處
  - 腳癬、頑癬等或化膿患處
- 使用本劑期間，請勿使用其他任何外用鎮痛消炎藥。
- 請勿連續使用2週或以上。(本劑可一時舒緩疼痛。若疼痛等症狀持續時，請停止使用本劑，接受醫師診療)



#### 諮詢事項

- 以下人群請在使用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
  - 正在接受醫師治療者
  - 曾對藥物等產生過敏症狀者
  - 孕婦或有可能懷孕者
  - 高齡者
  - 被診斷出患有以下疾病者 支氣管哮喘

- 使用後出現以下症狀時可能為副作用。

此情形時，請立即停止使用本品，並攜帶本包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、刺痛感、斑疹、水皰、出現瘀青、色素沉著
消化器官	胃部不適感、胸口疼痛
其他	浮腫

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	使用後馬上出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

- 使用後，可能會出現下列症狀之情形，此症狀情形持續或變嚴重時請停止使用本品，並攜帶本包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。  
腹瀉、軟便
- 使用5至6天後症狀並無改善時，請停止使用本品，並攜帶本包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。(有可能患有其他疾患)

### 功效

腰痛、伴隨肩膀痠痛的肩膀痛、關節痛、肌肉疼痛、腱鞘炎(手、手腕的疼痛)、手肘痛(網球肘等)、撞傷、扭傷

### 用法及用量

請揭開表面貼紙(薄膜)，1天1次貼敷於患處。

(用法及用量相關之注意事項)(1)請嚴格遵守用法及用量。(2)本劑並非為根治疼痛及腫脹之病源，僅為舒緩疼痛及腫脹等症狀之藥劑，因此僅限於出現症狀時使用。(3)1天用量不能超過4片。(4)出汗或患處濕漉時，請擦拭乾淨後使用。(5)皮膚較敏感者，請於使用前在手臂內側皮膚較敏感處，貼敷邊長1至2cm左右之方形貼片觀察半天或以上，在未確認到起疹、發紅、發癢、斑疹等症狀後使用。

### 成分及含量(每100g膏體中)

成分	含量	作用
Loxoprofen sodium hydrate	5.67 g (按無水物計算為5g)	抑制炎症及疼痛之根源【前列腺素】。

添加物: Styrene-isoprene-styrene-block copolymer (SIS), polyisobutylene, hydrogenated rosin glycerol ester, BHT, l-menthol, liquid paraffin, 及其他2種成分

【每片(7cm×10cm)膏體量1g】

### 保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請不要移至其他容器。(會導致誤用或變質)
- 為保證產品品質，請將開封後未使用之產品裝入袋子中，並將袋子密封保管。
- 請勿使用已超過所標識的使用期限的產品。另外，打開鋁包裝袋後，請盡快使用。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口  
郵遞區號103-8234 東京都中央區日本橋3-14-10  
電話號碼 0120-337-336  
受理時間 9:00~17:00(週六、週日及節假日除外)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

副作用被害救濟制度  
電話號碼 0120-149-931

07®註冊商標

銷售商  
第一三共醫療保健株式會社  
東京都中央區日本橋3-14-10

MADE IN JAPAN

製造銷售商  
LEAD CHEMICAL株式會社  
富山縣富山市日俣77-3