

綜合感冒藥

使用前請務必閱讀本說明書。
請妥善保管此說明書，以便在必要時取閱。

指定第 2 類醫藥品

用於舒緩喉嚨痛、發燒、鼻水、鼻塞、咳嗽、有痰

新ルルAゴールドDX α
新 Lulu @ A Gold DX α

新 Lulu A Gold DX α 的特點

- 可有效舒緩感冒的 11 種難耐症狀之綜合感冒藥。
可全家服用。(7 歲或以上)
- 抗炎成分[傳明酸]與解熱鎮痛成分[乙醯胺酚]發揮作用，有效舒緩喉嚨痛、發燒症狀。
- 含長效抗組織胺成分[延胡索酸可利汀]、副交感神經抑制成分[顛茄總生物鹼]、雙重功效舒緩鼻水、鼻塞。
- 祛痰成分[布朗信鹽酸鹽]，可使造成咳嗽的痰容易排出。
- 難以吞嚥藥劑的人群亦可輕鬆服用之無苦味小型糖衣錠。



使用注意事項



禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故。)

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘者
2. 服用本劑的期間，請勿使用以下任何醫藥品。
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等(鼻上用內服藥、暈車藥、過敏用藥等)、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有傳明酸之內服藥
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。
(可能會引起嗜睡與視力模糊、感覺異常刺眼等症狀)
4. 服用前後請勿飲酒。
5. 請勿長期連續服用。



諮詢事項

1. 以下人群請在服用前諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 哺乳期婦女
 - (4) 高齡者
 - (5) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (6) 有以下症狀的人
發高燒、排尿困難
 - (7) 被診斷出患有以下疾病的人
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼、血栓患者(腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎等)、可能會引發血栓症的人
2. 服用後若出現以下症狀時，有可能為副作用，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症 狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	頭暈、亢奮、痙攣、頭痛
呼吸器官	氣短、呼吸困難
泌尿器官	排尿困難
其他	過度的體溫低下、臉發燙、異常目眩

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症 狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、 中毒性表皮壞死鬆解症、 急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒 (小膿疱)、全身倦怠、沒有食慾等持續，或者突然惡化。
※ 藥物過敏症候群	皮膚大面積發紅、全身範圍發疹、發燒、體乏無力、淋巴結 (脖子、腋下及大腿根部) 出現腫脹等
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸 (皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛 (各關節疼痛)、腹瀉等。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼吸聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

3. 服用後，可能會出現下列症狀，此症狀持續或加重時請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。
便秘、口乾、嗜睡、視力模糊

4. 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

功效

舒緩感冒的各項症狀（喉嚨痛、發燒、流鼻水、鼻塞、咳嗽、生痰、惡寒、頭痛、打噴嚏、關節痛、肌肉疼痛）

用法・用量

請依照下述用量，用冷水或溫水送服。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
成人（15 歲或以上）	3 錠 	3 次 請在盡量於餐後半小時內服用。
11 歲或以上未滿 15 歲	2 錠 	
7 歲或以上未滿 11 歲	1 錠 	
未滿 7 歲	請勿服用	

<用法及用量的相關注意事項>

- 請嚴格遵守用法用量
- 7 歲或以上兒童服用時，請在家長或監護人指導監督下服用。

成分・分量

本劑為白色的糖衣錠，每 9 錠中含有以下成分。

成分	分量	作用
Clemastine fumarate	1.34 mg	持續抑制感冒之過敏症狀（鼻水、打噴嚏等）。
Belladonna total alkaloids	0.3 mg	抑制鼻水
Bromhexine hydrochloride	12 mg	可使造成咳嗽原因之一的痰容易排出。
Tranexamic acid	420 mg	抑制炎症根源之【血纖維蛋白溶解酶】，舒緩喉嚨腫痛。
Acetaminophen	900 mg	退燒、舒緩頭痛與關節疼痛。
dl -methylephedrine hydrochloride	60 mg	舒張支氣管、鎮咳。
Dextromethorphan Hydrobromide Hydrate	48 mg	作用於咳嗽之根源，鎮咳。
Anhydrous caffeine	60 mg	舒緩頭痛。

添加物：Cellulose, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, hypromellose, macrogol, titanium oxide, refined sugar, polyvinyl alcohol (partially saponified), talc, calcium carbonate, carnauba wax

保管及使用上的注意事項

- 請避免陽光直射，保管在潮氣小的陰涼處。
- 請保管在兒童無法觸及的地方。
- 請不要移至其他容器中（會導致誤用或變質）。
- 請勿用濕漉的手拿取藥劑。水分可能導致藥錠表面部分融化、變色或顏色不均。若將附有水分的藥錠放回藥瓶中，將影響其他錠劑之品質，因此請不要將濕漉的錠劑放回藥瓶。
- 藥瓶填充物是為防止運輸過程中錠劑破損，請在開封後將其丟棄。
- 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。請在打開藥瓶後 12 個月以內使用。
- 請在包裝盒的「開封年月日」記錄欄中，填寫開瓶日期。

為什麼會感冒？

感冒為「喉嚨」及「鼻子」等的「上呼吸道急性炎症性疾病」。

當病毒等從喉嚨及鼻子等入侵體內時，會引發過激的炎症反應。

其炎症反應會引發喉嚨疼痛、鼻水、咳嗽、痰等呼吸道症狀，嚴重時則會引起發燒等症狀。

首先，抑制炎症是舒緩感冒症狀之關鍵。



有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00~17:00（週六、週日及節假日除外）

有關 Lulu 之詳細資訊請進入網頁 www.lulu.jp

03®註冊商標



Daiichi-Sankyo

生產銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

公司網頁 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>