

缓解鼻塞流涕、发热和咽喉肿痛

日本制造

# 新ルル<sup>®</sup>Aゴールド<sup>s</sup>

新Lulu A Gold s 感冒药

综合感冒药

指定第2類医薬品



## 功能主治

缓解各种感冒症状（流涕、鼻塞、发烧、咽喉痛、咳嗽、有痰、打喷嚏、恶寒、头痛、关节痛、肌肉痛）

## 用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次服用量	1天服用次数
成人（15岁以上）	3粒	3次 请尽量在餐后半小时内服用。
12岁以上、未满15岁	2粒	
未满12岁	请勿服用。	

〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 12岁以上儿童服用时，需在家长的监督指导下服用。

## 成分、分量

本品是白色糖衣药片，每9粒本品含有以下药效成分。

成分	分量
Clemastine fumarate	1.34 mg
Belladonna total alkaloids	0.3 mg
Bromhexine hydrochloride	12 mg
Acetaminophen	900 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
Noscapine	48 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B <sub>1</sub> derivative)	24 mg

添加剂: Cellulose, magnesium aluminometasilicate, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, gum arabic, titanium oxide, stearic acid, refined sugar, talc, hypromellose, polyvinyl acetal diethyl aminoacetate, polyvinyl alcohol (partially saponified), povidone, fumaric acid, carnauba wax

### 禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿服用本品。

- (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
- (2) 曾因本品或其他感冒药、解热镇痛药而出现哮喘症状的人群
- (3) 未满12岁的儿童

2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、过敏用药等)、胃肠解痉止痛药

3. 服用后, 请不要驾驶车辆或操作机械类。(有时会出现困意, 视野模糊及感到异常的刺眼等症状)

4. 正在哺乳期的人群请不要服用本品, 如需服用时请避免哺乳。

5. 服用前后请勿饮酒。

6. 请勿长期服用本品。

### 需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
- (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
- (3) 高龄人群
- (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
- (5) 有下述症状的人群

高烧、排尿困难

(6) 被诊断患有下述疾病的人群

甲状腺功能紊乱、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、胃/十二指肠溃疡、青光眼、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症