

用於舒緩流鼻水、鼻塞、發燒、喉嚨痛

日本製

新ルル[®]Aゴールド^s

新 Lulu A Gold S 感冒藥

綜合感冒藥

指定第2類医薬品



效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（流鼻水、鼻塞、發燒、喉嚨疼痛、咳嗽、有痰、打噴嚏、發冷、頭痛、關節痛、肌肉痛）

用法與用量／使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
成人（15 歲以上）	3 錠	3 次 請儘量在飯後 30 分鐘內服用。
12 歲以上未滿 15 歲	2 錠	
未滿 12 歲		請勿服用。

< 用法與用量相關注意事項 >

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 12歲以上兒童服用時，須有家長在旁指導監督。

成分與份量

本劑為白色的糖衣錠，每 9 錠含有以下成分：

成分	份量
Clemastine fumarate	1.34 mg
Belladonna total alkaloids	0.3 mg
Bromhexine hydrochloride	12 mg
Acetaminophen	900 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
Noscapine	48 mg
<i>dl</i> -methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B ₁ derivative)	24 mg

添加物：Cellulose, magnesium aluminometasilicate, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, gum arabic, titanium oxide, stearic acid, refined sugar, talc, hypromellose, polyvinyl acetal diethyl aminoacetate, polyvinyl alcohol (partially saponified), povidone, fumaric acid, carnauba wax

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故)

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人
 - (3) 未滿12歲的兒童
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）、胃腸鎮痛鎮痙攣藥
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類器具。（可能會引起嗜睡與視力模糊、感到異常刺眼等症狀）
4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
5. 服用前後請勿飲酒。
6. 請勿長期連續服用。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 高齡者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (5) 有以下症狀的人
發高燒、排尿困難
 - (6) 被診斷出患有以下疾病的人
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼、呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症