

缓解咽喉痛、流鼻涕、发热等症状 加入对乙酰氨基酚和富马酸马斯汀

日本制造

新ルル[®]-A錠s

新Lulu-A 片剂 s 感冒药

综合感冒药

指定第2類医薬品



功能主治

缓解各种感冒症状（流涕、鼻塞、打喷嚏、咽喉痛、咳嗽、有痰、恶寒、发烧、头痛、关节痛、肌肉痛）

用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次使用量	1天服用次数
成人（15岁以上）	3粒	每天3次 请尽量在餐后半小时内服用。
12岁以上、未满15岁	2粒	
未满12岁		请勿服用。

〈使用注意〉

- 请严格遵守用法用量。
- 12岁以上儿童服用时，需在家长的监督指导下服用。

成分、分量

本品是白色糖衣药片，每9粒本品含有以下药效成分。

成分	分量
Acetaminophen	900 mg
Clemastine fumarate	1.34 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
Noscapine	48 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Guaiacol sulfonic acid potassium	240 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B ₁ derivative)	24 mg

添加剂: Cellulose, magnesium aluminometasilicate, CMC-Ca, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, gum arabic, titanium oxide, stearic acid, refined sugar, talc, hypromellose, polyvinyl acetal diethyl aminoacetate, polyvinyl alcohol (partially saponified), povidone, fumaric acid, carnauba wax

使用注意事项

禁忌事项

(违反禁忌事项, 可能会使症状恶化或容易引发副作用及意外事故)

1. 下列人群请勿服用本品。

- (1) 曾因为服用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群
- (2) 曾因本品或其他感冒药、解热镇痛药而出现哮喘症状的人群
- (3) 未满12岁的儿童

2. 在服用本品期间, 请不要使用下述的任何药品。

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含有抗组胺药的内服药等 (鼻炎用内服药、晕车药、过敏用药等)

3. 服用后, 请不要驾驶机动车或操作机械类。(有时会出现困意等)

4. 正在哺乳期的人群请不要服用本品, 如需服用时请避免哺乳。

5. 服用前后请勿饮酒。

6. 请勿长期服用本品。

需咨询

1. 下列人群在服用前, 请事先咨询医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
- (2) 孕妇或可能怀孕中的人群
- (3) 高龄人群
- (4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
- (5) 有下述症状的人群

高烧、排尿困难

(6) 被诊断患有下述疾病的人群

甲状腺功能紊乱、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、胃 / 十二指肠溃疡、青光眼、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、肥胖症