

使用前请务必阅读本说明书。

同时应对此说明书进行妥善保管，以便在必要时取阅。

指定第2类医药品

有效缓解因咳嗽、痰而困扰的感冒

Lulu Attack® CX

Lulu Attack CX 的特点

针对伴随难缠咳嗽及痰的感冒症状，含有磷酸双氢可待因、那可丁、消旋盐酸甲基麻黄碱、羧甲司坦等9种成分，发挥良好疗效的综合感冒药。

1. 作用于咳嗽中枢的2种镇咳成分——磷酸双氢可待因、那可丁，针对难止的咳嗽发挥良好疗效。
2. 消旋盐酸甲基麻黄碱舒张支气管舒缓呼吸，缓解难耐的咳嗽。
3. 祛痰成分羧甲司坦逐步化痰，让气管粘膜趋于正常，使造成咳嗽原因之一的痰更易排出。
4. 抗炎成分布洛芬针对咽喉疼痛及发烧症状，抗组胺成分马来酸右氯苯那敏针对感冒的过敏症状（鼻涕、鼻塞等）发挥良好疗效。
5. 铝箔泡罩包装方便携带。



使用注意事项



禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

1. 下述人群不要服用。

- (1) 曾因本品或本品成分出现过过敏症状的人群
- (2) 曾因服用本品或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群
- (3) 未满15岁的儿童
- (4) 预产期在12周以内的孕妇

2. 在服用本品期间，不要使用下述任何医药品。

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）

3. 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类。

（可能会出现嗜睡症状）

4. 处于哺乳期时不要服用本品，或在服用本品时不要进行哺乳。

5. 服用前后不要饮酒。

6. 不要连续服用超过5天。



咨询事项

1. 下列人群在服用前，请事先咨询医生、药剂师或登录销售者。

- (1) 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
- (2) 孕妇或有其可能性的人群
- (3) 老年人
- (4) 曾因药物等出现过过敏症状的人群
- (5) 拥有以下症状的人群：高烧、排尿困难
- (6) 接受以下诊断的人群：
甲状腺功能障碍、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、青光眼、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
- (7) 患有过以下疾病的人群：胃及十二指肠溃疡、溃疡性大肠炎、克隆氏病

2. 服用后若出现以下症状时，有可能为不良反应，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒、出现淤青
消化器官	恶心、呕吐、食欲不振、胃部不适、胃痛、口腔溃疡、烧心、胃胀、肠胃出血、腹痛、腹泻、血便
精神神经系统	头晕
循环系统	心悸
呼吸系统	气短
泌尿系统	排尿困难
其他	视线模糊、耳鸣、浮肿、鼻血、牙龈出血、出血不止、出血、背部疼痛、体温过低、全身无力

偶尔会出现下述重症。此时请立即前往医疗机构就诊。

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
皮肤黏膜眼综合征（史提芬强生症候群），中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇溃烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。
肝功能障碍	发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾功能障碍	出现发烧、起疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
无菌性脑膜炎	因颈部抽筋出现剧烈头痛、发烧、恶心及呕吐等症状。（尤其在接受全身性红斑狼疮或混合结缔组织病治疗的人群中多有该症状的报告案例。）
间质性肺炎	上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。
哮喘	可能会出现喘息、气喘和呼吸困难。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适眩晕、血尿等症状。
粒细胞缺乏症	出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。
呼吸抑制	出现气短、呼吸困难等症状。

3. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

便秘、口渴、嗜睡

4. 若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

（特别是发烧持续3天或以上，以及反复发烧时）

功能主治

缓解各种感冒症状（咳嗽、有痰、咽喉痛、鼻涕、鼻塞、发烧、恶寒、打喷嚏、头痛、关节痛、肌肉痛）

用法及用量

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年龄	1次用量	1天服用次数
成人（15岁或以上）	2片 	3次 请尽量在餐后半小时内服用。
未满15岁	请勿服用。	

〈用法及用量的相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法及用量。
- (2) 片剂取出方法

如右图所示，用手指尖用力按压铝箔泡罩包装突起部，片剂会刺破铝箔，并将其取出后服用。（若不慎连同包装一起误服，恐将导致包装刺伤食道粘膜等意外事故）



成分及分量

本品是白色薄膜衣片，每6片中含有以下成分。

成分	分量	作用
Ibuprofen	450 mg	作用于炎症与疼痛原因的【前列腺素】，抑制咽喉疼痛等症状，退烧。
Dihydrocodeine phosphate	24 mg	作用于咳嗽中枢，镇咳。
Noscapine	48 mg	
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg	舒张支气管，镇咳。
L-carbocisteine	750 mg	让气管粘膜趋于正常，使造成咳嗽原因之一的痰更易排出。
Glycyrrhizic acid	39 mg	缓解咽喉、鼻部粘膜的炎症。
d-chlorpheniramine maleate	3.5 mg	抑制感冒的过敏症状（鼻涕、鼻塞等）。
Anhydrous caffeine	75 mg	缓解头痛。
Benfotiamine (Vitamin B1 derivative)	25 mg	促进恢复因感冒而消耗的体力。

添加剂：D-mannitol, cellulose, polyoxyethylene hydrogenated castor oil, croscarmellose sodium, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, talc, silicic anhydride, polyvinyl alcohol (partial Saponified product), triethyl citrate, titanium oxide, carnauba wax

保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿使用超过标注使用期限的产品。
另外，请在打开铝包装袋后12个月或以内用完。
- (5) 请在包装盒的“开封年月日”记录栏中，填写打开铝包装袋的日期。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 顾客咨询室

邮编103-8234 东京都中央区日本桥3-14-10

电话号码 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

有关 Lulu 详细信息请进入网站 www.lulu.jp

02 ©注册商标



Daiichi-Sankyo

生产销售商

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10

公司官网 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>