

使用前請務必閱讀本說明書。
請妥善保管此說明書，以便在必要時取閱。

指定第 2 類醫藥品

對於伴隨咳嗽、生痰的感冒相當有效

Lulu Attack® CX

Lulu Attack CX 的特點

針對伴隨難纏的咳嗽與生痰的感冒症狀，調配磷酸二氫可待因、那可汀、鹽酸消旋甲基麻黃鹼、羧甲基半胱氨酸等9種成分，能發揮良好療效的綜合感冒藥。

1. 調配磷酸二氫可待因和那可汀2種作用於咳嗽中樞的鎮咳成分，能有效抑制難纏的咳嗽。
2. 鹽酸消旋甲基麻黃鹼有助於擴張支氣管，使呼吸順暢，有助舒緩難受的咳嗽。
3. 去痰成分的羧甲基半胱氨酸，能溶解濃稠痰液，並使氣管黏膜恢復正常，讓引起咳嗽原因之一的痰液更易排出。
4. 消炎成分的布洛芬有助於解熱及舒緩喉嚨痛，抗組織胺成分的馬來酸右氯苯那敏針對感冒引起的過敏症狀（流鼻水、鼻塞等）發揮良好療效。
5. 便於外出攜帶的PTP包裝。



使用注意事項



禁止事項

（若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故。）

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引發氣喘者
 - (3) 未滿15歲的兒童
 - (4) 預計在12週內生產的孕婦
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。

其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。

（可能會引起嗜睡等症狀）
4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
5. 服用前後請勿飲酒。
6. 請勿連續服用超過5天以上。



諮詢事項

1. 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕者
 - (3) 高齡者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀者
 - (5) 有以下症狀者：發高燒、排尿困難
 - (6) 被診斷出患有以下疾病者：

甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、青光眼、系統性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症
 - (7) 曾患有以下疾病者：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病

2. 服用後若出現以下症狀時，有可能為副作用，請立即停止服用本劑，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、出現瘀青
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不適感、胃痛、口內炎、胸口灼熱、腹脹、胃腸出血、腹痛、腹瀉、血便
精神神經系統	頭暈
循環器官	心悸
呼吸器官	氣短
泌尿器官	排尿困難
其他	視力模糊、耳鳴、浮腫、流鼻血、牙齦出血、出血不易停止、出血、背痛、過度的體溫低下、身體倦怠

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克（過敏性）	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅等持續，或者突然惡化。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。
無菌性腦膜炎	出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等。（尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人當中，許多人自訴這種症狀。）
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。
再生不良性貧血	出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等症狀。
無顆粒性白血球症	出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等症狀。
換氣不足	出現氣短、呼吸困難等症狀。

3. 服用後，可能會出現下列症狀，此症狀持續或加重時請停止服用本劑，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

便秘、口乾、嗜睡
4. 即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄銷售者。

（特別是發燒連續3天或以上、以及反復發燒時）

功效

舒緩感冒的各項症狀（咳嗽、生痰、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、發燒、惡寒、打噴嚏、頭痛、關節痛、肌肉疼痛）

用法·用量

請依照下述用量，用冷水或溫水送服。

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
成人（15 歲或以上）	2 錠 	3 次 請盡量於餐後半小時內服用。
未滿 15 歲	請勿服用。	

<用法及用量的相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 錠劑的取出方式

如右圖所示，請用指尖用力按壓裝有錠劑的 PTP 包裝的凸起部分，擠破背面的鋁箔，取出錠劑後服用。（若不慎連同包裝一起誤服，恐將導致刺穿食道黏膜等意外事故。）



成分·分量

本劑為白色薄膜衣錠，每 6 錠中含有以下成分。

成 分	分 量	作 用
Ibuprofen	450 mg	作用於發炎症狀和疼痛源頭的【前列腺素】，發揮抑制喉嚨痛等，及退燒的療效。
Dihydrocodeine phosphate	24 mg	作用於咳嗽中樞，舒緩咳嗽。
Noscapine	48 mg	
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg	使支氣管擴張，舒緩咳嗽。
L-carbocisteine	750 mg	使氣管黏膜恢復正常，讓引起咳嗽原因之一的痰液更易排出。
Glycyrrhizic acid	39 mg	抑制喉嚨與鼻黏膜的發炎症狀。
d-chlorpheniramine maleate	3.5 mg	抑制感冒的過敏症狀（流鼻水、鼻塞等）。
Anhydrous caffeine	75 mg	舒緩頭痛。
Benfotiamine (Vitamin B1 derivative)	25 mg	促進恢復因感冒而消耗的體力。

添加物：D-mannitol, cellulose, polyoxyethylene hydrogenated castor oil, croscarmellose sodium, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, talc, silicic anhydride, polyvinyl alcohol (partial Saponified product), triethyl citrate, titanium oxide, carnauba wax

保管及使用上的注意事項

- (1) 請避免陽光直射，保管在潮氣小的陰涼處。
- (2) 請保管在兒童無法觸及的地方。
- (3) 請不要移至其他容器中（會導致誤用或變質）。
- (4) 請勿使用已超過所標示使用期限之產品。請在打開鋁包裝袋後 12 個月以內使用。
- (5) 請在包裝盒的「開封年月日」記錄欄中，填寫打開鋁包裝袋之日期。

有關本品資訊，請向所購買的店鋪或以下窗口諮詢。

第一三共醫療保健株式會社 顧客諮詢窗口

郵遞區號 103-8234 東京都中央區日本橋 3-14-10

電話號碼 0120-337-336

受理時間 9:00 ~ 17:00（週六、週日及節假日除外）

有關 Lulu 之詳細資訊請進入網頁 www.lulu.jp

02®註冊商標



生產銷售商

第一三共醫療保健株式會社

東京都中央區日本橋 3-14-10

公司網頁 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>