

對於流鼻水、鼻塞型感冒相當有效

日本製

ルルアタック[®] NX

Lulu Attack NX 感冒藥

綜合感冒藥



指定第2類医薬品

效能與效果

舒緩感冒的各種症狀（流鼻水、鼻塞、喉嚨疼痛、咳嗽、有痰、發燒、發冷、打噴嚏、頭痛、關節痛、肌肉痛）

用法與用量／使用方法

請以下列用量配冷開水或熱開水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人（15歲以上）	2錠	3次請儘量在飯後30分鐘內服用。
未滿15歲	請勿服用。	

〈用法與用量相關注意事項〉

(1) 請嚴格遵守用法與用量。

成分與份量

本劑為白色的膜衣錠，每6錠含有以下成分：

成分	份量
Ibuprofen	450 mg
Belladonna total alkaloids	0.3 mg
Clemastine fumarate	1.34 mg
Bromhexine hydrochloride	12 mg
Dihydrocodeine phosphate	24 mg
dl-methylephedrine hydrochloride	60 mg
Anhydrous caffeine	75 mg
Benfotiamine (vitamin B ₁ derivative)	25 mg
Riboflavin (vitamin B ₂)	12 mg

添加物：Corn starch, lactose, cellulose, CMC-Na, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, polyvinyl alcohol-acrylic acid-methyl methacrylate copolymer, talc, titanium oxide, hypromellose, carnauba wax

〈成分與份量相關注意事項〉

本劑所含的核黃素（維生素B₂）可能會導致尿液變黃。

禁止事項

(若不遵守可能會導致目前的症狀惡化，或容易產生副作用或事故)

1. 以下情形者請勿服用。
 - (1) 曾因本劑或本劑的成分而引發過敏症狀者
 - (2) 曾因服用本劑或其他鎮痛解熱藥、感冒藥而引起氣喘的人
 - (3) 未滿 15 歲的兒童
 - (4) 生產預定日期在 12 週以內的孕婦
2. 服用本劑的期間，請勿服用以下醫藥品。
其他感冒藥、鎮痛解熱藥、鎮靜藥、鎮咳去痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）、胃腸鎮痛鎮痙藥
3. 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械類裝置。（可能會引起嗜睡與視力模糊、感覺異常刺眼等症狀）
4. 哺乳中的人請勿服用本劑，服用本劑時請避免哺乳。
5. 服用前後請勿飲酒。
6. 請勿連續服用超過 5 天以上。

使用前需預先諮詢的人

1. 以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - (2) 孕婦或有可能懷孕的人
 - (3) 高齡者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
 - (5) 有以下症狀的人
發高燒、排尿困難
 - (6) 被診斷出患有以下疾病的人
甲狀腺功能紊亂、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、青光眼、係統性紅斑狼瘡、混合型結締組織疾病、呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸暫停症候群、肥胖症
 - (7) 曾患有以下疾病的人
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病