

有效治疗喉咙疼和喉咙肿

日本制造

# ペラック®T錠

## PELACK T 片剂

口腔咽喉用药

第3類医薬品



### 功能主治

咽喉炎、扁桃体炎（喉咙肿、喉咙痛）、口腔溃疡

### 用法用量 / 使用方法

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年龄	1次服用量	1天服用次数
成人 (15岁及以上)	2粒	3次
7岁以上、未满15岁	1粒	请在早中晚各服用一次。
未满7岁		请勿服用。

#### 〈使用注意〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 餐前餐后皆可服用。
- (3) 让7岁以上的儿童服用时，需在家长的监督指导下服用。

### 成分、分量

本品为淡黄色的薄膜片剂，每六粒中含有以下成分。

成分	分量
Tranexamic acid	750 mg
Powdered extract of glycyrrhiza	198 mg (相当于 crude drug 990 mg)
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B <sub>6</sub> )	50 mg
Riboflavin (Vitamin B <sub>2</sub> )	12 mg
Sodium L-ascorbate (Vitamin C sodium)	500 mg

添加剂: Cellulose, silicic anhydride, polyvinyl alcohol (partially saponified), corn starch, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, talc, propylene glycol, dimethylpolysiloxane, silicon dioxide, iron sesquioxide, carnauba wax

#### 〈有关成分、分量的注意事项〉

- (1) 由于本品含有的核黄素（维生素B<sub>2</sub>），有时尿液会变黄色。
- (2) 服用本品可能会对尿液及粪便检查结果产生影响。

在医院进行检查时，请提前告知医生正在服用含有维生素C的制剂。

## 使用注意事项

### 禁忌事项

(如违反禁忌事项，容易引起症状恶化或引发副作用)

1. 在服用本品期间，请不要使用下述的任何药品。

(1) 甘草或主要成分中含有甘草酸的内服药

(可能会引发水肿、血压上升、肌肉病变等问题)

(2) 含有氯甲环酸的内服药

(如鼻炎用内服药、感冒药、退热止疼药、镇咳祛痰药等)

2. 请勿长期服用本品。

### 需咨询

1. 下列人群在服用前，请事先咨询医生或药剂师。

(1) 正在接受过医生或牙科医生治疗的人群

(2) 孕妇或可能怀孕中的人群

(3) 高龄人群

(4) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群

(5) 有下述症状的人群

水肿

(6) 被诊断有下述疾病的人群

高血压、心脏病、肾脏病、血栓人群（脑血栓形成、心肌梗死、静脉血栓形成等）、可能引发血栓的人群