

使用前请务必阅读本说明书。

同时应对此说明书进行妥善保管，以方便在必要时取阅。

针对痛苦难耐的感冒症状，早上服用，效果可持续到夜晚。

# プレコール<sup>®</sup>CR 持続性錠

Precol<sup>®</sup> CR 缓释片


综合感冒药<吡唑啉酮类>

指定第2类医药品



## Precol CR 缓释片的特点

- 以2种解热镇痛成分（异丙安替比林、对乙酰氨基酚）为主的7种有效成分均衡搭配，针对咽喉疼痛、发烧等难耐的感冒症状发挥综合疗效。
- 通过独家制剂技术（Control Release Technology），实现可在体内呈现2种不同模式的溶解层（速溶层与缓释层）。
- 1天早晚各服用1次。易于服用的片状综合感冒药。



## 功能主治

缓解各类感冒症状（咽喉疼痛、发烧、鼻涕、鼻塞、咳嗽、痰、恶寒、头痛、关节痛、肌肉疼痛、打喷嚏）

## 用法及用量

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年齢	1次用量	1天服用次数
成年人（15岁及以上）	3片	2次 （尽量在早餐、晚餐后30分钟以内服用）
未满15岁	请勿服用。	

<用法及用量相关注意>

- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 片剂取出方法

如右图所示，用手指尖用力按压铝箔泡罩包装突起部，片剂会刺破铝箔，并将其取出。（若不慎连同包装一起误服，恐将导致包装刺伤食道粘膜等意外事故）



## 成分及分量

本品为白色薄膜衣片，每6片中含有以下成分。

成分	分量	作用
Isopropylantipyrine (pyrene medicine)	300mg	退烧，缓解咽喉疼痛、头痛、关节痛。
Acetaminophen	450mg	
Chlorpheniramine maleate	6mg	抑制鼻涕、鼻塞、喷嚏。
Dihydrocodeine phosphate	18mg	镇咳。
dl-methylephedrine hydrochloride	60mg	镇咳止痰。
Powdered extract of glycyrrhiza	90mg (相当于原生药750mg)	缓解咽喉、鼻部粘膜的炎症。
Anhydrous caffeine	75mg	缓解头痛。

添加剂: lactose, hydroxypropyl cellulose, cellulose, Magnesium stearate, hypromellose, methacrylic acid copolymer L, titanium oxide, macrogol, talc, stearic acid, carnauba wax.

## 使用注意事项

### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故)

- 下述人群不要服用。
  - 因本品或本品成分出现过过敏症状的人群
  - 因服用本品或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群
  - 未满15岁的儿童
- 在服用本品期间，不要使用下述任何医药品。  
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）
- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类。（可能会出现嗜睡症状）
- 处于哺乳期时不要服用本品，或在服用本品时不要进行哺乳。
- 服用前后不要饮酒。
- 不要长期连续服用。

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
  - 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
  - 孕妇或有其可能性的人群
  - 老年人
  - 因药物等出现过过敏症状的人群
  - 拥有以下症状的人群：高烧、排尿困难
  - 接受以下诊断的人群：甲状腺功能障碍、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、胃及十二指肠溃疡、青光眼、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症

## 保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管在潮气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿使用超过标注使用期限的产品。

有关本产品信息，请咨询购买其的药局或以下联系窗口。

第一三共医药保健株式会社 消费者服务窗口

邮 编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

联系电话 0120-337-336

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日休息）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®注册商标

生产销售厂家

第一三共医药保健株式会社

东京都中央区日本桥 3-14-10

中国語（簡体中文）

2020.7 作成

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附属说明文件。