

トラフル[®]軟膏

Traful 口腔溃疡软膏

口腔溃疡治疗用药

第3類医薬品



功能主治

口腔溃疡、舌炎

用法用量 / 使用方法

清洁患处后，取适量软膏涂抹于患处，每天使用2～4次。

〈使用注意〉


- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 儿童使用时，需在家长的监督指导下使用。
- (3) 请不要将本品用于口腔以外的部位。

Traful 软膏的使用方法

- 1. 使用本品前，请先漱口清洁口腔。
- 2. 涂抹时，请用本品完全覆盖住患处。
- 3. 涂抹后，请尽量不要碰触患处。

(管口的开封方法)

开封时，请翻转盖子，将突起部位用力压向管口。



成分、分量

每100g本品含有以下成分。

成分	分量
Azulene sodium sulfonate hydrate	0.02 g
Glycyrrhetic acid	0.3 g
Allantoin	0.3 g
Cetylpyridinium chloride hydrate	0.1 g

添加剂：Glycerin, gelatinized hydrocarbon, sodium polyacrylate, magnesium aluminometasilicate, hypromellose, *l*-menthol, sodium saccharate

需咨询

1. 下列人群在使用前，请前往咨询医生、牙科医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人群
- (2) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
- (3) 患处较大的人群