

# トラフル®軟膏

Traful 軟膏

口内炎治療薬



第3類医薬品

## 效能與效果

口内炎、舌炎

## 用法與用量／使用方法

1 日 2 ~ 4 次，於清潔患部之後適量塗抹。

< 用法與用量相關注意事項 >


- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 讓兒童使用時，須有家長在旁指導監督。
- (3) 僅限使用於口腔。

Traful 軟膏的使用方法

1. 使用本劑之前，請先漱口保持清潔。
2. 請將本劑塗抹覆蓋住患部。
3. 塗抹之後，請儘量避免接觸到患部。

< 軟管的開封方法 >

請將上蓋逆向對準軟管封口，  
利用突起部位用力刺入軟蓋封口以進行開封。



## 成分與份量

本劑每 100g 含有以下成分：

成分	分量
Azulene sodium sulfonate hydrate	0.02 g
Glycyrrhetic acid	0.3 g
Allantoin	0.3 g
Cetylpyridinium chloride hydrate	0.1 g

添加物：Glycerin, gelatinized hydrocarbon, sodium polyacrylate, magnesium aluminometasilicate, hypromellose, l-menthol, sodium saccharate

### 使用前需預先諮詢的人

1. 下列情形者，使用前請先向醫師、牙科醫師、藥劑師諮詢。
  - (1) 正在接受醫師或牙科醫師的治療者
  - (2) 曾對藥物等產生過敏症狀的人
  - (3) 患部範圍較大的人