

## 维生素 C 主成分药剂

### 第 3 类医药品

缓解色斑、雀斑、日晒或皮疹造成的色素沉淀

# TRANSINO<sup>®</sup> White C clear

## TRANSINO White C clear 的特点

- L-半胱氨酸与维生素 C 配合，抑制造成色斑与雀斑原因的黑色素生成。还可促进肌肤新陈代谢，促进黑色素排出，缓解色斑、雀斑与日晒造成的色素沉淀。
- 维生素 C 淡化已形成的黑色素。
- 内含可带来健康肌肤的 4 种维生素(E、B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>、B<sub>3</sub>)



## 使用注意事项



### 咨询事项

1. 下列人群在服用前，请事先咨询医师、药剂师或登录销售者。
  - (1) 正在接受医生治疗的人群
  - (2) 曾出现因药物等引起过敏症状的人群
2. 服用后若出现以下症状时，有可能为不良反应，请立即停止服用本剂，并携带本说明书，咨询医师、药剂师或登录销售者。

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、发痒
消化器官	恶心、呕吐、胃部不适感、腹痛

3. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

腹泻、便秘
4. 若服用 1 个月左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录销售者。
5. 服用后可能会使月经提前，经血量稍微变多。长时间出血时，应携带本说明书咨询医师、药剂师或登录销售者。

## 功能主治

1. 缓解以下症状：色斑、雀斑、日晒或皮疹造成的色素沉淀
2. 以下情况时补充维生素 C：身体疲劳时、孕期、哺乳期、病时病后体力低下时、老年期
3. 预防以下出血症状：牙龈出血、流鼻血

“如使用本品 1 个月左右后，上述 1 与 3 的症状仍未得到改善时，请咨询医师、药剂师或牙科医师。”

## 用法及用量

请依照下述用量用凉水或温水送服。

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
成人（15 岁或以上）	2 片	2 次 请在早晚各服用 1 次。
7 岁或以上未满 15 岁	1 片	
未 满 7 岁	请勿服用。	

### 〈用法及用量的相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法及用量。
- (2) 饭前、饭后均可服用。
- (3) 7 岁或以上儿童需在监护人的监督指导下服用本品。

## 成分及分量

本品为白色至微带红色的白色薄膜衣片，每 4 片中含有以下成分。

Ascorbic acid (vitamin C)	1000 mg
L-cysteine	240 mg
D-alpha tocopherol succinate (natural vitamin E)	50 mg
Riboflavin (vitamin B <sub>2</sub> )	6 mg
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B <sub>6</sub> )	12 mg
Nicotinic acid amid (vitamin B <sub>3</sub> )	60 mg

添加剂：corn starch, lactose, cellulose, carmellose, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, hypromellose, titanium oxide, talc, macrogol, carnauba wax

### 〈成分及分量的相关注意事项〉

- (1) 服用本品可能会对尿液及粪便检查结果产生影响。在医院进行检查时，请提前告知医生正在服用含有维生素 C 的制剂。
- (2) 本品加入的核黄素（维生素 B<sub>2</sub>）可能会导致尿液颜色变黄。

## 保管及使用注意事项

- (1) 请避免阳光直射，保管在湿气小的阴凉处。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（易导致误用或变质）。
- (4) 未关紧容器盖子时，有可能会受到潮气影响而导致本品变质。因此使用后请将瓶盖关紧。
- (5) 请勿用湿漉的手拿取药剂。水分可能导致片剂表面部分融化、变色或颜色不均。若将附有水分的药片放回药瓶中，将影响其他片剂质量，因此请不要将潮湿的片剂放回药瓶。
- (6) 药瓶内填充物是为防止运输过程中片剂破损，请在开封后将其丢弃。
- (7) 药瓶内装有干燥剂，在用完所有药品之前不要将干燥剂丢弃。另外，请注意不要错误服用干燥剂。
- (8) 请勿使用超过标注使用期限的产品。

有关本品信息，请向所购买的店铺或以下窗口咨询。

第一三共医药保健株式会社 TRANSINO 咨询室

邮编 103-8234 东京都中央区日本桥 3-14-10

电话号码 0120-013-416

工作时间 9:00~17:00（周六、周日及节假日除外）

有关 TRANSINO 品牌的详细信息请进入网站 [www.transino.jp](http://www.transino.jp)

02® 注册商标



生产销售商

第一三共医药保健株式会社

Daiichi-Sankyo 东京都中央区日本桥 3-14-10

公司官网 <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>