

2011年5月25日(水)

第一三共ヘルスケア株式会社

- 胃酸過多による胃痛・むかつきによく効くH₂ブロッカー薬、女性にも -

「ガスター10[®]」新包装品を追加発売

発売日：2011年6月1日(水)

第一三共ヘルスケア株式会社(本社：東京都中央区、社長：高橋利夫)は、H₂ブロッカー薬「ガスター10[®]」ブランドのラインアップとして、女性の声を参考にデザインした新包装品(OTC医薬品：第1類医薬品)を本年6月1日(水)に追加発売します。



「ガスター10[®]」は、胃の様々な症状の原因となる過剰な胃酸分泌をコントロールする成分「ファモチジン」を配合したH₂ブロッカー薬で、胃酸中和型の胃腸薬とは異なるタイプの胃腸薬です。

1997年の発売以来、胃痛やむかつきなどへの優れた効果により、多くのお客様からご支持をいただいておりますが、ブルー基調の包装デザインなどから男性的なイメージが強いため、胃腸薬(液剤除く)購入者の約半数が女性であるのに対し、「ガスター10[®]」では約4割に留まっています*1。また、OTC胃腸薬を最もよく使用する目的について症状別に割合を調べたところ、胃酸過多により起こりやすい症状の一つである胃痛をあげる女性は男性よりも多い傾向にありました*2。

このことから、女性がより手に取りやすい包装を目指し、当社調査において女性に好評であったピンクの包装を新たに追加することとしました。

なお、剤形は飲みやすい小粒の錠剤と、サッと溶ける散剤を揃えています。

【TV-CM】

当製品のTV-CMを6月中旬から放映します。「ガスター10[®]」のイメージキャラクター坂口憲二さんに加え、モデルの清野優美^{せいの ゆみ}さんが重要なプレゼンテーション中に胃がキリキリと痛む女性を演じます。

*1 2009年・第一三共ヘルスケア調べ(全国20-50代男女 n=1,552)

*2 2010年・第一三共ヘルスケア調べ(首都圏25-44歳男女 n=2,152)

製品概要

[第一三共ヘルスケア製品]

| 製品名 | 「ガスター10 [®] 」 | 「ガスター10 [®] 散」 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------------|--|------------|------------|--|
| 分類 | O T C 医薬品 (第1類医薬品) | | | | | | | | | | | | | |
| 包装・価格 | <包装> <メーカー希望小売価格(税込み)> 6錠 1,029円 | <包装> <メーカー希望小売価格(税込み)> 6包 1,029円 | | | | | | | | | | | | |
| 成分・分量 | 1錠中 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成分</th> <th style="width: 50%;">分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ファモチジン</td> <td style="text-align: center;">10mg</td> </tr> </tbody> </table> 添加物：リン酸水素Ca、セルロース、乳糖水和物、 ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシ デンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸Ca、 白糖、乳酸カルシウム水和物、マクロゴール、 酸化チタン、タルク、カルナウバロウ | 成分 | 分量 | ファモチジン | 10mg | 1包中 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成分</th> <th style="width: 50%;">分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ファモチジン</td> <td style="text-align: center;">10mg</td> </tr> </tbody> </table> 添加物：D-ソルビトール、ヒドロキシプロピルセルロース、 l-メントール、無水ケイ酸 | 成分 | 分量 | ファモチジン | 10mg | | | | |
| 成分 | 分量 | | | | | | | | | | | | | |
| ファモチジン | 10mg | | | | | | | | | | | | | |
| 成分 | 分量 | | | | | | | | | | | | | |
| ファモチジン | 10mg | | | | | | | | | | | | | |
| 効能・効果 | 胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき（本剤はH ₂ ブロッカー薬を含んでいます。） | | | | | | | | | | | | | |
| 用法・用量 | 胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれた時、下記の1回の量を、水又はお湯で服用してください。 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年齢</th> <th style="width: 30%;">1回服用量</th> <th style="width: 40%;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15歳以上、80歳未満)</td> <td style="text-align: center;">1錠(1包)</td> <td style="text-align: center;">2回まで</td> </tr> <tr> <td>小児(15歳未満)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">服用しないでください</td> </tr> <tr> <td>高齢者(80歳以上)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">服用しないでください</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠(1包)服用してください。 ・症状が治まった場合は、服用を止めてください。 ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談してください。 ・2週間を超えて続けて服用しないでください。 | | 年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 | 成人(15歳以上、80歳未満) | 1錠(1包) | 2回まで | 小児(15歳未満) | 服用しないでください | | 高齢者(80歳以上) | 服用しないでください | |
| 年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 | | | | | | | | | | | | |
| 成人(15歳以上、80歳未満) | 1錠(1包) | 2回まで | | | | | | | | | | | | |
| 小児(15歳未満) | 服用しないでください | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者(80歳以上) | 服用しないでください | | | | | | | | | | | | | |
| 製造販売元 | 第一三共ヘルスケア株式会社 | | | | | | | | | | | | | |
| 発売日 | 2011年6月1日(水) | | | | | | | | | | | | | |

〔製品特徴〕

胃痛・むかつき・胸やけ・もたれに優れた効果を発揮します。

過剰に分泌した胃酸をコントロールすることにより、傷ついた胃粘膜の修復を早めます。

直径7mmの小粒で飲みやすい糖衣錠と、l-メントール配合で口の中でサッと溶けて、スーッとする散剤を揃えています。

「ガスター10[®]」ブランドサイト：<http://www.gaster10.jp/>