

あなたにぴったりのロキソニンはどれ？

スマートフォンでも▶



医療用成分を
同量配合



ロキソニンS

第1類医薬品 頭痛・生理痛

胃にやさしい成分※1
をプラス



ロキソニンSプラス

第1類医薬品 生理痛・頭痛

服用後、
錠剤がすばやく崩壊※2



ロキソニンS クイック

第1類医薬品 頭痛・生理痛

プレミアム※3の
独自処方



ロキソニンSプレミアム

第1類医薬品 頭痛・生理痛

生理痛の
メカニズムに着目



ロキソニンSプレミアムファイン

第1類医薬品 生理痛・頭痛

腰・肩の痛みに速効



ロキソニンPROフィジカル

第1類医薬品 腰痛・肩こり痛

おすすめの
方は

- さまざまな痛み・発熱の常備薬に
- ベーシックな鎮痛薬をお求めの方に

製品特徴



単一成分の
シンプル処方



胃にやさしい
成分※1を配合



服用しやすい
小型錠



胃を守る
成分※4を配合



速く効く



胃を守る
成分※4を配合



つらい頭痛に



鎮痛補助
成分※5を
プラス配合



胃を守る
成分※4を配合



生理痛に



鎮痛補助
成分※6を
プラス配合



胃にやさしい
成分※1を配合



身体の痛み



鎮痛補助
成分※7を
プラス配合

眠くなる成分
(鎮静成分等)

含まない

(服用後眠くなりにくい)

含まない

(服用後眠くなりにくい)

含まない

(服用後眠くなりにくい)

含む

(服用後は乗物又は機械類の
運転操作をしないで下さい)

含まない

(服用後眠くなりにくい)

含まない

(服用後眠くなりにくい)

1回服用量

1回1錠

1回1錠

1回1錠

1回2錠

1回2錠

1回2錠

錠剤サイズ
(実物大)
& 錠剤特徴



直径9ミリの
うすい紅色の素錠



直径8ミリのうすい紅色の
フィルムコーティング錠



直径9ミリの白色の素錠



直径8ミリのうすい紅色の
フィルムコーティング錠



直径8ミリのうすい紅色の
フィルムコーティング錠



直径8ミリのうすい紅色の
フィルムコーティング錠

※1 酸化マグネシウム

※2 服用後、錠剤がすばやく崩壊する独自技術「クイックブレイク®製法」を採用

※3 プレミアムとは、ロキソニンSプレミアムのこと

※4 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム

※5 アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン

※6 シャクヤク乾燥エキス・ヘスペリジン

※7 シャクヤク乾燥エキス・カンゾウ乾燥エキス

ロキソニン解熱鎮痛薬シリーズ購入時は裏面の使用上の注意を確認ください

ロキソニン解熱鎮痛薬シリーズは、薬剤師から説明を受け「使用上の注意」をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は、必ずご相談ください。

ご購入時の確認事項

次の人はこのお薬を服用することはできません ← ポイント!

- ☐ 過去に本剤又は本剤に含まれる成分でアレルギー症状等の過敏な反応を起こしたことがある人
- ☐ 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

ロキソプロフェンナトリウム水和物、アスピリン(アセチルサリチル酸)、アスピリンアルミニウム、エテンザミド、イブプロフェン、アセトアミノフェン及びイソプロピルアンチピリンが配合されているもの
- ☐ 15歳未満の小児
- ☐ 医療機関で次の治療を受けている人
 - 胃・十二指腸潰瘍 ●肝臓病 ●腎臓病 ●心臓病
- ☐ 医師から以下のような血液異常(血液の病気)を指摘されている人
 - 赤血球数が少ない(貧血)
 - 血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)
 - 白血球数が少ない
- ☐ 出産予定日12週以内の妊婦

次の人はこのお薬を服用する際に注意が必要です 購入される前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談下さい。

- ☐ 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- ☐ 妊婦(出産予定日12週以内の妊婦を除く)又は妊娠していると思われる人
- ☐ 授乳中の人
- ☐ 高齢者(65歳以上)
- ☐ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ☐ 次の診断を受けた人
 - 気管支ぜんそく ●潰瘍性大腸炎 ●クローン病
 - 全身性エリテマトーデス ●混合性結合組織病
- ☐ 次の病気にかかったことがある人
 - 胃・十二指腸潰瘍 ●肝臓病 ●腎臓病 ●血液の病気

服用時の注意事項

このお薬の使い方は?

○症状がある場合だけ服用して下さい。

痛みや熱等の原因になっている病気そのものを治療するお薬ではありません。
発現している症状を抑えるお薬ですので、症状がある場合だけ服用して下さい。

ロキソニン®S	ロキソニン®Sプラス	ロキソニン®S グイック
1回1錠	1回1錠	1回1錠
ロキソニン®S プレミアム	ロキソニン®S プレミアムファイン	ロキソニン®PROフィジカル
1回2錠	1回2錠	1回2錠

なるべく空腹時をさせて、コップ1杯程度の水又はぬるま湯で服用して下さい。

○1日2回まで

再度痛み等の症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上時間をおいて下さい。

このお薬を服用する際に、確認すべきことは?

- 症状が改善したら服用を中止して下さい。
- 1～2回服用しても症状が一向によくならない場合は、他の疾患の可能性がありますので服用を中止し、説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 長期連続して服用しないで下さい。 ← ポイント!
(3～5日間服用しても痛み等の症状が繰り返される場合には、服用を中止し、医師の診療を受けて下さい。)
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、**乗物酔い薬【ロキソニンSプレミアムのみ】**
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります。)[ロキソニンSプレミアムのみ]
- 服用前後は飲酒しないで下さい。
- 誤って多く服用した場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- このお薬を服用した後、**消化性潰瘍(胃もたれ、胸やけ、背中での痛み)、むくみがあらわれた場合には、直ちに服用を中止し、説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。**

実際に服用する際には、添付文書をよく読んで、用法・用量を守って正しくお使い下さい。