

2016年8月31日（水）
第一三共ヘルスケア株式会社

H₂ブロッカー胃腸薬のリーディングブランド、発売20年目を迎えパッケージデザインを一新

ガスター10[®]シリーズをリニューアル発売

発売日：2016年9月1日（木）

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：西井良樹）は、胃痛・もたれなどの胃の不快な症状に優れた効果を発揮するガスター10シリーズ〔「ガスター10」「ガスター10 S錠」「ガスター10〈散〉」（いずれもOTC医薬品：第1類医薬品）〕のパッケージを一新し、本年9月1日（木）にリニューアル発売します。



左から、「ガスター10」、「ガスター10 S錠」、「ガスター10〈散〉」

ガスター10シリーズは胃酸中和型の胃腸薬とは異なり、胃酸の過剰な分泌をコントロールするH₂ブロッカー胃腸薬です。1997年にスイッチOTC医薬品*として発売されて以来、H₂ブロッカー胃腸薬のリーディングブランドとしてご支持をいただいています。

このたびのリニューアルでは、従来のイメージを踏襲しながらも、ガスター10シリーズの適した症状に悩むお客様へ製品特徴や対象症状が端的に伝わる表現を追求し、パッケージデザインを一新します。また、30代を中心に幅広い層の信頼と共感が得られる俳優として、濱田岳^{がく}さんを新イメージキャラクターに起用しました。今後、TV-CMやウェブサイト、店頭ツールなどを通じ、新しくなったガスター10シリーズを伝えてまいります。

当社は第1類医薬品であるガスター10シリーズを適正にご使用いただくため、購入時に薬剤師による説明をサポートする小冊子などの提供を行います。引き続き、医薬品の適正使用推進に主眼を置いたプロモーションに努め、胃の不快な症状に悩む方々のQOL（生活の質）向上とともに、セルフメディケーションの浸透に貢献してまいります。

〔製品特徴〕

- ◎ 胃酸の過剰な分泌をコントロールするH₂ブロッカー胃腸薬。胃痛・もたれなどの胃の不快な症状を原因から改善し、荒れた胃粘膜の修復を促します。
- ◎ 1回1錠（包）で、優れた効果を発揮します。
- ◎ 小型で飲みやすい錠剤、水なしでも服用できる口中速溶タイプ、口溶けがよく清涼感のある散剤を揃えています。

* スイッチOTC医薬品とは、医師により処方される医療用医薬品の成分を、処方箋を必要とせず、薬局やドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用したものを指す名称です。

製品概要

製 品 名	「ガスター10 [®] 」										
分 類	OTC医薬品（第1類医薬品）										
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格（税抜き）> 6錠 980円 12錠 1,580円										
成分・分量	本剤は糖衣錠で、1錠中に次の成分を含有しています。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成分</th> <th style="width: 50%;">分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ファモチジン</td> <td style="text-align: center;">10mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	ファモチジン	10mg						
成分	分量										
ファモチジン	10mg										
効能・効果	胃痛、もたれ、胸やけ、むかつき										
用法・用量	胃痛、もたれ、胸やけ、むかつきの症状があらわれた時、次の量を、水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年齢</th> <th style="width: 30%;">1回量</th> <th style="width: 30%;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上、80歳未満）</td> <td style="text-align: center;">1錠</td> <td style="text-align: center;">2回まで</td> </tr> <tr> <td>小児（15歳未満）</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">服用しないで下さい。</td> </tr> <tr> <td>高齢者（80歳以上）</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上、80歳未満）	1錠	2回まで	小児（15歳未満）	服用しないで下さい。		高齢者（80歳以上）
年齢	1回量	1日服用回数									
成人（15歳以上、80歳未満）	1錠	2回まで									
小児（15歳未満）	服用しないで下さい。										
高齢者（80歳以上）											
製造販売元	第一三共ヘルスケア株式会社										
発 売 日	2016年9月1日（木）										

製 品 名	「ガスター10 [®] S錠」										
分 類	OTC医薬品（第1類医薬品）										
包装・価格	<包装> <メーカー希望小売価格（税抜き）> 6錠 980円 12錠 1,580円										
成分・分量	本剤は白色の錠剤で、1錠中に次の成分を含有しています。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成分</th> <th style="width: 50%;">分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ファモチジン</td> <td style="text-align: center;">10mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	ファモチジン	10mg						
成分	分量										
ファモチジン	10mg										
効能・効果	胃痛、もたれ、胸やけ、むかつき										
用法・用量	胃痛、もたれ、胸やけ、むかつきの症状があらわれた時、次の量を、口中で溶かして服用するか、水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年齢</th> <th style="width: 30%;">1回量</th> <th style="width: 30%;">1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上、80歳未満）</td> <td style="text-align: center;">1錠</td> <td style="text-align: center;">2回まで</td> </tr> <tr> <td>小児（15歳未満）</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">服用しないで下さい。</td> </tr> <tr> <td>高齢者（80歳以上）</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上、80歳未満）	1錠	2回まで	小児（15歳未満）	服用しないで下さい。		高齢者（80歳以上）
年齢	1回量	1日服用回数									
成人（15歳以上、80歳未満）	1錠	2回まで									
小児（15歳未満）	服用しないで下さい。										
高齢者（80歳以上）											
製造販売元	第一三共ヘルスケア株式会社										
発 売 日	2016年9月1日（木）										

製品名	「ガスター10 [®] 〈散〉」											
分類	OTC医薬品（第1類医薬品）											
包装・価格	<包装> 6包 12包	<メーカー希望小売価格（税抜き）> 980円 1,580円										
成分・分量	本剤は散剤で、1包（0.5g）中に次の成分を含有しています。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> <tr> <td>ファモチジン</td> <td>10mg</td> </tr> </table>		成分	分量	ファモチジン	10mg						
成分	分量											
ファモチジン	10mg											
効能・効果	胃痛、もたれ、胸やけ、むかつき											
用法・用量	胃痛、もたれ、胸やけ、むかつきの症状があらわれた時、次の量を、水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> <tr> <td>成人（15歳以上、80歳未満）</td> <td>1包</td> <td>2回まで</td> </tr> <tr> <td>小児（15歳未満）</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">服用しないで下さい。</td> </tr> <tr> <td>高齢者（80歳以上）</td> </tr> </table>		年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上、80歳未満）	1包	2回まで	小児（15歳未満）	服用しないで下さい。		高齢者（80歳以上）
年齢	1回量	1日服用回数										
成人（15歳以上、80歳未満）	1包	2回まで										
小児（15歳未満）	服用しないで下さい。											
高齢者（80歳以上）												
製造販売元	第一三共ヘルスケア株式会社											
発売日	2016年9月1日（木）											

〔ご参考〕

1. H₂ブロッカーとは

胃酸は消化に必要なものですが、必要以上に分泌されると胃粘膜を傷つけ、胃の不快な症状（胃痛、もたれ、胸やけ、むかつき）の原因になります。胃酸は、生理活性を促す情報伝達物質が主に胃の細胞壁にある受容体に結合することで分泌されます。その一つがヒスタミンH₂受容体です。H₂ブロッカーはこの受容体に結合して蓋の役割をすることで、過剰な胃酸の分泌をコントロールします。

2. 従来品 製品画像



ガスター10 ブランドサイト：www.gaster10.jp

（9月15日 リニューアルオープン）