

복용 시 반드시 이 설명서를 읽으십시오. 또한, 필요할 때 확인할 수 있도록 소중히 보관하십시오.

요지도 의약품

응급피임약  
**ノルレボ®**  
 NORLEVO®

### 제품 특징

- NORLEVO®는 여성이 복용하는 응급피임약입니다.
- 응급피임약은 피임을 하지 않고 성교하였거나, 콘돔 파열 등으로 인하여 피임에 실패한 경우, 임신을 예방하기 위하여 복용하는 약입니다.
- 이 약을 복용하여도 반드시 임신이 예방되는 것은 아닙니다. **복용 후 3 주 뒤 임신진단테스트기를 사용하거나 의료기관에서 검사를 받아 임신 여부를 확인하십시오.**  
임신진단테스트기의 결과가 양성인 경우 가능한 신속하게 의료기관에서 검사를 받으십시오.
- 성교 전에 이 약을 복용하여도 임신을 방지할 수 없습니다.
- NORLEVO®는 성교 후 **72 시간 이내에 복용**하여야 합니다.
- 교육을 수료한 약사에게 복용 전후의 주의사항에 대한 설명을 들은 후 **이 약을 1 정 구입하고, 해당 약사의 앞에서 복용**하십시오.

### ⚠ 사용상의 주의사항



#### 금지 사항

(따르지 않을 경우 부작용 위험이 증가합니다.)

#### 1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

- (1) 이 약 또는 이 약의 성분에 알레르기 이력이 있는 사람
- (2) 다음 진단을 받은 사람  
간 질환
- (3) 임부
- (4) 남성

#### 2. 수유 중인 여성은 복용을 피하거나, 복용 후 최소 24 시간 동안 수유를 삼가십시오.



#### 상담 필요

#### 1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전 약사와 상담하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받는 사람
- (2) 약물 등으로 인한 알레르기 증상을 경험한 사람
- (3) 다음 진단을 받은 사람  
· 심장 질환  
· 신장 질환  
· 음식과 약물의 흡수를 방해하는 중증도의 소화기 질환
- (4) 서양고추나물(세인트 존스 워트 또는 성요한초)\*가 함유된 식품을 섭취 중인 사람  
\* 유럽 및 아시아가 원산인 물레나물과의 다년초로 산야에 자생합니다. 독일에서는 추출물이 향우울제로 사용되며, 일본에서는 건강보조식품으로 판매됩니다.

#### 2. 복용 후 다음 증상이 나타나는 경우 부작용일 가능성이 있으므로, 이 설명서를 지참하여 의사 또는 약사와 상담하십시오.

관련 부위	증상
소화기계	구역·구토, 하복부 통증, 설사, 복통
신경계	두통, 졸음, 어지럼, 불안
생식계	비정상 출혈, 월경 이상(과다, 지연)
기타	빈혈, 권태감·피로, 부유성 어지럼, 구강 건조, 발열, 사지 부종, 유방 압통(유방을 누르거나 만졌을 때 발생하는 통증)

#### 3. 복용 후 다음 증상이 확인되는 경우 임신 등의 가능성이 있으므로, 이 설명서를 지참하여 신속하게 의사 또는 약사와 상담하십시오.

- (1) 월경(생리)이 예정된 시기\*\*부터 7 일 이상 오지 않는 경우
- (2) 월경(생리)과 같은 출혈, 두통, 구역, 권태감, 졸음 등 월경(생리) 시 또는 임신 초기와 유사한 증상이 7 일 이상 지속되는 경우
- (3) 월경(생리)이 예정된 시기\*\*보다 일찍 오거나 출혈량이 평상시와 다른 경우  
\*\*이 약을 복용하기 전 가장 최근 월경(생리)이 시작된 날로부터 약 1 개월 후(28 일 주기의 경우)

(뒷면으로 계속)



## 기타 주의사항

1. 이 약은 복용 전 이미 임신한 경우에는 효과가 없습니다.  
임산부는 복용하지 마십시오.
2. 이 약은 성교 후 긴급하게 임신을 방지하는 의약품입니다.  
이 약을 복용하더라도 임신할 수 있으므로 계획적으로 피임하고자 하는 경우에는 저용량 경구피임제를 지속적으로 복용하는 등 다른 피임 효과가 높은 방법을 사용하십시오.
3. 이 약의 효과는 복용 후 즉시 확인할 수 없습니다. 복용 후 3 주 뒤 임신진단테스트기를 사용하거나 의료기관에서 검사를 받아 임신 여부를 확인하십시오.  
임신진단테스트기의 결과가 양성인 경우 가능한 신속하게 의료기관에서 검사를 받으십시오.

## 효능·효과

### 응급피임

#### < 효능·효과에 관한 주의사항 >

- (1) 이 약을 복용하여도 반드시 임신이 예방되는 것은 아닙니다.
- (2) 이 약은 성교 시 피임을 하지 않거나 피임에 실패한 경우에 임신을 방지하는 의약품이며, 성교하기 전에 복용하여도 임신을 방지할 수 없습니다.
- (3) 이 약을 복용한 후에도 임신할 수 있으므로 적절한 방법으로 피임하십시오.

## 용법·용량

성교 후 72 시간 이내에 약사에게 이 약 1 정을 받아 그 자리에서 복용하십시오.

#### < 용법·용량에 관한 주의사항 >

- (1) 용법·용량을 엄격히 준수하십시오. 필요한 경우에는 가능한 빨리 복용하십시오.
- (2) 복용 전 약사에게 복용 전후의 주의사항에 대한 설명을 들으십시오.
- (3) 정제를 꺼내는 방법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 돌출부를 손가락으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 찢고, 정제를 꺼내 복용하십시오(실수로 그대로 삼킬 경우 식도점막에 상처를 입는 등 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다).

누름



## 성분·함량

1 정 중

성분	함량	작용 기전
Levonorgestrel	1.5 mg	배란을 억제하고, 수정을 방해하고, 수정란의 자궁 착상을 저지하여 임신을 막는 것으로 추측됩니다.

첨가제: Lactose Hydrate, Corn Starch, Povidone, Light Anhydrous Silicic Acid, Magnesium Stearate

## 보관 및 취급상 주의사항

- (1) 외포장과 설명서를 소중히 보관하십시오.
- (2) 유효기간이 지난 제품은 복용하지 마십시오. 유효기간은 외포장에 표시되어 있습니다.

## 문의처

제품에 대하여 궁금한 사항은 구매처 또는 아래 연락처로 문의하십시오.

다이이찌산쿄헬스케어고객상담실  
(우)103-8234 도쿄도 주오구 니혼바시 3-14-10  
전화: 0120-337-336  
평일: 9:00~17:00(토, 일, 공휴일 제외)

<https://www.daiichisanryo-hc.co.jp/>

01@등록상표



제조판매원

아스카제약 주식회사

도쿄도 미나토구 시바우라 니초메 5 번 1 호



Daiichi-Sankyo

판매원

다이이찌산쿄헬스케어 주식회사

도쿄도 주오구 니혼바시 3-14-10