

Leia atentamente este explicativo antes de tomar este medicamento e guarde-o para futuras consultas.

Contraceptivo de Emergência

ノルレボ®
Norlevo®

**Medicamento sujeito à
orientação do farmacêutico**

Características do Produto

- O NORLEVO® é um contraceptivo de emergência para mulheres
- Os contraceptivos de emergência são medicamentos tomados para prevenir a gravidez após relações sexuais desprotegidas ou falha do método contraceptivo (por exemplo, ruptura do preservativo).
- Tomar este medicamento não garante 100% de prevenção da gravidez. **Confirme se está grávida utilizando um teste de gravidez ou consultando um médico 3 semanas após o uso.**
Se o teste for positivo, consulte um médico o quanto antes.
- Tomar este medicamento antes da relação sexual não previne a gravidez.
- O NORLEVO® **deve ser tomado até 72 horas** após a relação sexual.
- Após confirmação e explicação das precauções por um farmacêutico qualificado, compre e **tome 1 comprimido na presença do farmacêutico.**

⚠️ Precauções de Utilização



Contraindicações

(O não cumprimento pode aumentar o risco de efeitos secundários)

1. Não tome este medicamento caso

- (1) Tiver histórico de alergia a este medicamento ou a algum dos seus componentes
- (2) Foi diagnosticada com Doença hepática
- (3) Está grávida
- (4) É do sexo masculino

2. Mulheres a amamentar devem evitar tomar este medicamento ou evitar amamentar durante pelo menos 24 horas após o uso.



Pontos a consultar com o farmacêutico

1. Antes de tomar este medicamento, consulte o farmacêutico nos casos abaixo

- (1) Está em fase de algum tratamento médico
- (2) Tem histórico de alergia a medicamentos, etc.
- (3) Foi diagnosticada com
 - Doença cardíaca
 - Doença renal
 - Distúrbios digestivos graves
- (4) Está consumindo alimentos que contenham hipericão (erva de São João)*
* Planta perene da família Hypericaceae, nativa da Europa e da Ásia, que cresce espontaneamente nas montanhas e nos campos. Seu extrato é usado como antidepressivo na Alemanha e vendido como suplemento alimentar no Japão.

2. Se após o uso do medicamento apresentar algum dos seguintes sintomas, há a possibilidade de serem efeitos secundários. Consulte um médico ou farmacêutico levando este explicativo consigo.

Partes relacionadas	Sintomas
Sistema digestivo	Náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia
Sistema nervosa	Dor de cabeça, sonolência, tonturas, ansiedade
Sistema reprodutor	Sangramento anormal, irregularidades menstruais (menstruação abundante ou atrasada)
Outros	Anemia, fadiga, sensação de flutuação, boca seca, febre, inchaço dos membros, dor mamária (dor ao pressionar ou tocar a mama)

3. Se após o uso ocorrer algum dos seguintes casos, há a possibilidade de gravidez. Consulte um médico ou farmacêutico o quanto antes.

- (1) A menstruação atrasa mais de 7 dias em relação à data prevista
- (2) Se apresentar sangramento semelhante ao menstrual ou sintomas de gravidez inicial, como dor de cabeça, náusea, fadiga ou sonolência, que persistem por mais de 7 dias.
- (3) A menstruação ocorre mais cedo do que o esperado ou a quantidade de sangue é anormal

** Aproximadamente 1 mês após o início da sua última menstruação, antes de tomar este medicamento (se o seu período menstrual for de 28 dias).

(Continua no verso)



Outras Notas

- Este medicamento não é eficaz se já estiver grávida antes de utilizar.**
Mulheres grávidas não devem tomar este medicamento.
- Este medicamento destina-se apenas à contracepção de emergência após a relação sexual.**
Existe a possibilidade de gravidez mesmo após tomar este medicamento, portanto, se você pretende usar um método contraceptivo, utilize um método altamente eficaz, como o uso contínuo de anticoncepcionais orais de baixa dosagem.
- Não é possível saber imediatamente após tomar este medicamento se ele funcionou. 3 semanas após tomá-lo, faça um teste de gravidez ou procure atendimento médico.**
Se o resultado do teste de gravidez for positivo, procure atendimento médico o quanto antes.

Eficácia e Efeitos

Contraceptivo de emergência

<Precauções relativas à eficácia e aos efeitos>

- Tomar este medicamento não previne completamente a gravidez.
- Este medicamento previne a gravidez quando ocorre relação sexual desprotegida, mas tomar este medicamento antes da relação sexual não impede a gravidez.
- Há a possibilidade de gravidez mesmo após tomar este medicamento, portanto, utilize um método contraceptivo adequado.

Dosagem e Administração

Tome 1 comprimido na presença do farmacêutico até 72 horas após a relação sexual.

<Precauções relativas à dosagem e administração>

- Siga rigorosamente as instruções de dosagem e administração, tomando o mais rápido possível quando necessário.
- Antes de tomar este medicamento, realize a confirmação com o seu farmacêutico, também ouvindo a explicação após o seu uso as precauções a serem tomadas.
- Como retirar os comprimidos
Pressione firmemente com a ponta dos dedos a parte saliente da cartela de PTP que contém o comprimido para romper a folha de alumínio na parte de trás, retire o comprimido e tome-o (se você engolir parte da embalagem acidentalmente, ele pode perfurar a mucosa esofágica ou causar outros acidentes inesperados).

Empurrar
para fora



Composição e Quantidade

Em 1 comprimido

Composição	Quantidade	Ação
Levonorgestrel	1.5 mg	Inibe a ovulação, impede a fertilização, impede a implantação do óvulo fertilizado no útero, prevenindo a gravidez.

Aditivos: Lactose hidratada, amido de milho, povidona, sílica anidra leve, estearato de magnésio

Armazenamento e Manuseio

- Guarde a embalagem exterior e o folheto explicativo em um local seguro.
- Não tome medicamentos fora do prazo de validade. O prazo está indicado na embalagem exterior.

Contato

Em caso de dúvidas, consulte a farmácia onde adquiriu o medicamento ou a empresa abaixo
Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd. — Atendimento ao Cliente
3-14-10, Nihonbashi, Chuo-ku, Tóquio Cód. Postal 103-8234
Telefone: 0120-337-336
Atendimento das 9:00 às 17:00 (exceto sábados, domingos e feriados.)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01@Marca registrada



Fabricante
Asuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-5-1 Shibaura, Minato-ku, Tóquio



Distribuidora
Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd.
3-14-10, Nihonbashi, Chuo-ku, Tóquio