

第2類医薬品

花粉による鼻づまり、鼻水、くしゃみに

エージーアレルカット[®] EX <季節性アレルギー専用>

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド) 配合点鼻薬

エージーアレルカットEX(季節性アレルギー専用)の特徴

1. 抗炎症作用と抗アレルギー作用を併せ持つ「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル」が、鼻粘膜にダイレクトに作用し、花粉によるつらい鼻づまりや鼻水、くしゃみをおさえます。
2. 朝の使用で夕方まで、夕方の使用で朝まで効果が続く点鼻薬です。(通常1日2回使用した場合)
3. 患部に留まり液ダレしにくい、モイストタイプの点鼻薬です。
4. あらゆる角度から噴霧可能で、最後まで使いきれるスプレー容器を使用しています。
5. 鼻炎用内服薬や点眼薬と同時にお使いいただけます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の診断を受けた人
全身の真菌症、結核性疾患、高血圧、糖尿病、反復性鼻出血、ぜんそく、緑内障、感染症
- (3) 鼻腔内が化膿(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)している人
- (4) 18歳未満の人
- (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- * (6) ステロイド点鼻薬を過去1年間のうち3カ月以上使用した人

* 2. 本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3カ月を超えて使用しないで下さい。(3カ月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性があるので耳鼻咽喉科専門医に相談して下さい)

3. 本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないで下さい。ただし、医師から処方された場合は、その指示に従って下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
- (3) 頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人(感染性副鼻腔炎)
- (4) 授乳中の人
- (5) 高齢者
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
- (8) 肥厚性鼻炎*1や鼻たけ(鼻ポリープ)*2の人
※1: 鼻のまわりが重苦しく、少量の粘液性又は黄色や緑色の鼻汁がでる
※2: 鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある
- (9) 長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	鼻出血、鼻の中のかさばた、刺激感、かゆみ、乾燥感、不快感、くしゃみの発作、嗅覚異常、化膿症状(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
のど	刺激感、異物感、化膿症状(感染によって、のどの奥に白っぽい膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
消化器	吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振
精神神経系	頭痛、めまい
循環器	動悸、血圧上昇
その他	ぜんそくの発現、目の痛み、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 頭、額や頬などに痛みがでたり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(他の疾患が併発していることがあります)
4. 1週間位(1日最大4回(8噴霧)まで)使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

* 効能・効果

花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ

使用法

年齢	1回量	1日使用回数
成人(18歳以上)	左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ	通常2回(朝・夕) (最大4回(8噴霧)まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上おいて下さい)
18歳未満	使用しないで下さい。	

●症状が改善すれば使用回数を減らして下さい。
症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまいません。

* ●1年間に3カ月を超えて使用しないで下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 本剤は、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用方法で使用する、副作用が起こりやすくなる場合があります。
- (3) ノズルが鼻中隔*に向かないよう、鼻腔内にまっすぐ入れて噴霧して下さい。特に右利きの方では右の鼻中隔に、左利きの方では左の鼻中隔に向きやすいため注意して下さい。
* 鼻中隔: 鼻の穴の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁
- (4) 点鼻用にのみ使用して下さい。
- (5) 使用時に味がした場合には、口をゆすいで下さい。

1. 使用前にていねいに鼻をかんで下さい。(あまりきつくかまないで下さい)
2. 青いキャップをはずして、図のように容器を持って下さい。(使い始めは、薬液が噴霧するまで数回、空押しして下さい)
3. ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、薬液を1回噴霧して下さい。もう一方の鼻腔でも同じ操作をくり返して下さい。
4. 使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めて下さい。



成分・分量

本剤は、白色懸濁性の粘稠な液で、100g中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.05g	鼻粘膜に作用して、鼻づまり・鼻水等をおさえます。

添加物: カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、エタノール、等張化剤、ベンザルコニウム塩化物、エドト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東興薬品工業株式会社
富山県中新川郡立山町辻20