

ご使用前に必ずお読みください



花粉による鼻づまり、鼻水、くしゃみに

エージーアレルカット[®] EX

<季節性アレルギー専用>

第2類医薬品

このお薬は？

販売名	エージーアレルカットEX(季節性アレルギー専用)
成分・分量 (100g中)	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 0.05g
医薬品分類	指定第2類医薬品

このお薬の効果は？

- このお薬は、合成副腎皮質ホルモン剤(ステロイド)と呼ばれるグループに属する点鼻薬です。
- このお薬は、アレルギー反応を抑え、花粉による季節性アレルギーの鼻の症状を緩和します。
- このお薬は、次の症状の方が使用できます。
花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ
- 十分な効果を得るために、定められた用法どおりに使用することが重要です。

このお薬を購入する前に、確認すべきことは？

- 次の人は、このお薬を使用することはできません。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
次の診断を受けた人 全身の真菌症、結核性疾患、高血圧、糖尿病、反復性鼻出血、ぜんそく、緑内障、感染症
鼻腔内が化膿(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)している人
18歳未満の人
妊婦又は妊娠していると思われる人
ステロイド点鼻薬を過去1年間のうち3カ月以上使用した人

このお薬を使用する際に、確認すべきことは？

本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3カ月を超えて使用しないで下さい。(3カ月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性がありますので耳鼻咽喉科専門医に相談して下さい)

本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないで下さい。ただし、医師から処方された場合は、その指示に従って下さい。

- 次の人は、このお薬を使用する際に注意が必要です。購入する前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

医師の治療を受けている人
減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人(感染性副鼻腔炎)
授乳中の人
高齢者
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
肥厚性鼻炎 ^{*1} や鼻たけ(鼻ポリープ) ^{*2} の人 ※1: 鼻のまわりが重苦しく、少量の粘液性又は黄色や緑色の鼻汁がでる ※2: 鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある
長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人

このお薬の使い方は？

- 使用量及び回数

年齢	1回量	1日使用回数
成人 (18歳以上)	左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ	通常2回(朝・夕) (最大4回(8噴霧)まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上おいて下さい)
18歳未満	使用しないで下さい。	

- 症状が改善すれば使用回数を減らして下さい。
- 症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまいません。
- 1年間に3カ月を超えて使用しないで下さい。

- ・ 使用法を厳守して下さい。
- ・ 本剤は、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用方法で使用すると、副作用が起りやすくなる場合があります。
- ・ ノズルが鼻中隔^{*}に向かないよう、鼻腔内にまっすぐ入れて噴霧して下さい。特に右利きの方では右の鼻中隔に、左利きの方では左の鼻中隔に向きやすいため注意して下さい。
- ※ 鼻中隔: 鼻の穴の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁
- ・ 点鼻用のみ使用して下さい。
- ・ 使用時に味がした場合には、口をゆすいで下さい。

○どのように使用するか？

使用前にいいに鼻をかんで下さい。(あまりきつくかまないで下さい)

 <p>① 青いキャップをはずします。</p>	
 <p>② 図のように容器を持って下さい。 (使い始めは、薬液が噴霧するまで数回、空押しして下さい)</p>	
 <p>③ ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、薬液を1回噴霧して下さい。 もう一方の鼻腔でも同じ操作をくり返して下さい。</p>	
 <p>④ 使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めて下さい。</p>	

○このお薬を適切に使用するためには？

- ・本剤は通年性アレルギー性鼻炎の人は使用しないで下さい。
通年性アレルギー性鼻炎は、ダニ、ハウスダスト等により1年を通して症状があらわれることから、漫然と使用することを防ぐための注意です。
- ・本剤は、安全性の観点から他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3カ月を超えて使用する場合には耳鼻咽喉科専門医への相談が必要となります。不明な点があれば、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

○使用し忘れた場合の対応

2回分を1度に使用しないで下さい。

○多く使用した時(過量使用時)の対応

異常を感じたら医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

副作用は？

まれに起こる特にご注意いただきたい重篤な副作用と、主な症状を記載しました。副作用であれば、記載した症状のうち、いくつかの症状が同じ時期にあらわれることが一般的です。

その場合は、直ちに使用を中止し、医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	鼻出血、鼻の中のかさぶた、刺激感、かゆみ、乾燥感、不快感、くしゃみの発作、嗅覚異常、化膿症状(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
のど	刺激感、異物感、化膿症状(感染によって、のどの奥に白っぽい膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
消 化 器	吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振
精神神経系	頭痛、めまい
循 環 器	動悸、血圧上昇
そ の 他	ぜんそくの発現、目の痛み、目のかすみ

鼻出血は鼻を強くかんだ場合などにも起こりますが、たびたび鼻出血が起きたり、鼻の中にかさぶたができた場合には、鼻中隔穿孔(鼻中隔に穴が開く状態)に進行する可能性もありますので、直ちに使用を中止し、医師の診療を受けて下さい。

このお薬の使用中に気をつけなければならないことは？

頭、顔や頬などに痛みがでたり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(他の疾患が併発していることがあります)

1週間位(1日最大4回(8噴霧)まで)使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

このお薬に含まれているものは？

有効成分	100g中	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.05g
添 加 物	カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、エタノール、等張化剤、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤		

・本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

その他

○このお薬の保管方法は？

- ・直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- ・小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ・他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)

○他の人と共用しないで下さい。

○表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。

このお薬についてのお問い合わせ先は？

第一三共ヘルスケア株式会社

(<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>)

お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話:0120-337-336

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)