

● エージーアレルカットEX〈季節性アレルギー専用〉

【使用上の注意】

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 次の診断を受けた人
全身の真菌症、結核性疾患、高血圧、糖尿病、反復性鼻出血、ぜんそく、緑内障、感染症
 - (3) 鼻腔内が化膿(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)している人
 - (4) 18歳未満の人
 - (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人

【解 説】

1.
 - (1) 共通事項解説[1]参照
 - (2) 記載されている疾患の診断を受けた人は、本剤に配合されている成分により、症状が悪化するおそれがありますので、服用を避ける必要があります。
 - 全身性の真菌症、結核性疾患、感染症
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)には局所の抗炎症作用がありますが、一方では免疫反応を抑制するため、細菌類、真菌類、ウイルス等による皮膚の感染症を悪化させるおそれがあります。
 - 高血圧
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)は血圧を上昇させることがあるため、高血圧が悪化するおそれがあります。
 - 糖尿病
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)は血糖値を上昇させることがあるため、糖尿病が悪化するおそれがあります。
 - 反復性鼻出血
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)により、鼻粘膜の毛細血管が収縮したり、鼻粘膜が薄くなり出血しやすくなります。もともと鼻出血を起こしやすい場合は、その症状を悪化させるおそれがあります。
 - ぜんそく
ぜんそくと鼻炎は関連しています。自己判断で使用せず、ぜんそくの治療と一緒に医師による治療を受ける必要があります。
 - 緑内障
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)により眼圧亢進、緑内障が起こることがあるため、症状を悪化させるおそれがあります。
 - (3) ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)は免疫反応を抑制するため、感染症を悪化させるおそれがあります。
 - (4) 海外の一般用医薬品(ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)では、18歳未満の人の使用を禁止しています。使用経験が少なく、安全性が確立していないため、18歳未満の人には使用しないで下さい。
 - (5) 共通事項解説[5]参照

● エージーアレルカットEX〈季節性アレルギー専用〉

【使用上の注意】

- (6) ステロイド点鼻薬を過去1年間のうち3カ月以上使用した人
2. 本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3カ月を超えて使用しないで下さい。(3カ月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性がありますので耳鼻咽喉科専門医に相談して下さい)
3. 本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないで下さい。ただし、医師から処方された場合は、その指示に従って下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
- (3) 頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人(感染性副鼻腔炎)
- (4) 授乳中の人
- (5) 高齢者
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
- (8) 肥厚性鼻炎^{*1}や鼻たけ(鼻ポリープ)^{*2}の人
※1：鼻のまわりが重苦しく、少量の粘性又は黄色や緑色の鼻汁がでる
※2：鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある
- (9) 長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人

【解 説】

- (6) 安全性の観点から、他のステロイド配合点鼻薬を、1年間に3カ月以上使用した人は使用しないで下さい。
2. 安全性の観点から本剤だけでなく、他のステロイド配合点鼻薬も合わせて、1年間に3カ月以上使用しないための注意です。3カ月を超えても、まだ使用が必要な場合は、「花粉による季節アレルギー」でない可能性があるため、耳鼻咽喉科専門医に相談する必要があります。
3. 本剤使用後は、医師の処方したものを除き、自己判断で他のステロイド配合点鼻薬を使用しないための注意です。
- 1.
- (1) 共通事項解説〔4〕参照
- (2) 医師の投薬又は治療を受けている場合には、本剤の成分との重複作用による副作用を起こしたり、医師による治療を妨げるおそれがあります。
- (3) ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)は免疫反応を抑制するため、感染症を悪化させるおそれがあります。
- (4) 乳児への具体的な有害反応は不明で、安全性は確立されていないため、使用前に専門家に相談して服薬指導等の指示を受ける必要があります。
- (5) 共通事項解説〔6〕参照
- (6) 共通事項解説〔7〕参照
- (7) 花粉による鼻のアレルギー症状に効果を発揮する点鼻薬なので、アレルギーが原因であることを確認する必要があります。
- (8) 肥厚性鼻炎や鼻たけ(鼻ポリープ)の人は、これらの症状を軽減するための治療を受けた方がよいとされているので確認が必要です。
- (9) 医師の投薬又は治療を受けている場合には、本剤の成分との重複作用による副作用を起こしたり、医師による治療を妨げるおそれがあります。

● エージーアレルカットEX〈季節性アレルギー専用〉

【使用上の注意】

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	鼻出血、鼻の中のかさぶた、刺激感、かゆみ、乾燥感、不快感、くしゃみの発作、嗅覚異常、化膿症状(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
の ど	刺激感、異物感、化膿症状(感染によって、のどの奥に白っぽい膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
消化器	吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振
精神神経系	頭痛、めまい
循環器	動悸、血圧上昇
その他	ぜんそくの発現、目の痛み、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 頭、額や頬などに痛みがでたり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(他の疾患が併発していることがあります)
4. 1週間位(1日最大4回(8噴霧)まで)使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【解 説】

2. 例示したような副作用が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。

下記のような重篤な副作用があらわれたら、直ちに使用を中止し、医師の診断を受ける必要があります。

- ショック(アナフィラキシー)
重篤な症状の解説[1]参照
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)により、まれではありますが、アナフィラキシーの報告があります。例示したような症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止して医師の診療を受ける必要があります。
3. 使用後に頭、額や頬などに痛みが出たり、鼻汁が黄色や緑色になった場合は、感染性副鼻腔炎を発症している可能性があります。直ちに使用を中止し、専門家に相談する必要があります。
4. 1週間位(1日最大4回(8噴霧)まで)使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患や合併症も考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。

● エージーアレルカットEX〈季節性アレルギー専用〉

【使用上の注意】	【解 説】
【使用法に関連する注意】	
<ol style="list-style-type: none">1. 使用法を厳守して下さい。2. 本剤は、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用法で使用すると、副作用が起こりやすくなる場合があります。3. ノズルが鼻中隔[*]に向かないよう、鼻腔内にまっすぐ入れて噴霧して下さい。特に右利きの方では右の鼻中隔に、左利きの方では左の鼻中隔に向きやすいため注意して下さい。 ※鼻中隔：鼻の穴の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁4. 点鼻用にのみ使用して下さい。5. 使用時に味がした場合には、口をゆすいで下さい。	<ol style="list-style-type: none">1. 共通事項解説〔8〕参照2. ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)による副作用を防ぐため、使用法を正しく守る必要があります。3. 医療用医薬品において鼻中隔穿孔が認められたとの報告があります。できるだけ、鼻中隔に薬液がかかるのを防ぐための注意です。4. 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。5. 薬液が鼻腔から咽頭へ落ちてくる場合があります。使用時に味を感じたら飲み込まず、口をゆすいで下さい。
【成分・分量に関連する注意】	
本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。	アルコールにより、感じる場合があります。
【保管及び取扱い上の注意】	
<ol style="list-style-type: none">1. 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)4. 他の人と共用しないで下さい。5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。	<ol style="list-style-type: none">1. 共通事項解説〔11〕参照2. 共通事項解説〔12〕参照3. 共通事項解説〔13〕参照4. 汚染による感染を防ぐための注意です。5. 共通事項解説〔17〕参照