

■ 鎮痒消炎薬

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

■ 第2類医薬品

かゆみ・虫さされに…

# アレルギール<sup>®</sup>クリーム

## アレルギールクリームの特徴

- 虫さされなどのかゆみに、早く、すぐれた効果のあるかゆみ止めクリームです。
- 局所麻酔剤 塩酸リドカインをはじめ、消炎・鎮痒作用のある副腎皮質ホルモン剤 プレドニゾロン酢酸エステル、抗ヒスタミン剤 クロルフェニラミンマレイン酸塩、殺菌剤 クロルヘキシジン塩酸塩などの成分を配合しています。
- 虫さされのみならず、はげしいかゆみや炎症を伴う皮膚症状にすぐれた効果が期待できます。
- バニシングタイプのクリームですから、塗布したあと、ベタつかず、皮膚によく浸透し、使用感もさわやかです。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### \*1. 次の人は使用しないで下さい。

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人

#### 2. 次の部位には使用しないで下さい。

- 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 目の周囲、粘膜等

#### 3. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。

#### 4. 長期連用しないで下さい。



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- 医師の治療を受けている人
- 妊娠又は妊娠していると思われる人
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 患部が広範囲の人
- 湿潤やただれのひどい人

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
* ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

#### 3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ■ 効能・効果

かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん、かぶれ、しもやけ、かみそりまけ、湿疹、皮膚炎

## ■ 使用法

1日1～数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関する注意〉

(1) 使用法を厳守して下さい。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

(3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

(4) 外用にのみ使用して下さい。

## ■ 成分・分量

本剤は、特異な芳香があるほとんど白色の製剤で、100g中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
塩酸リドカイン	3g	かゆみ・痛みをすみやかにしめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1g	かゆみをしめます。
プレドニゾロン酢酸エステル	0.125g	かゆみ・炎症をやわらげます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.2g	かき傷などの化膿を防ぎます。
サリチル酸メチル	2g	熱をとり、痛みをしめます。
I-メントール	0.5g	かゆみをしめます。
d-カンフル	0.5g	痛み・かゆみをしめます。

添加物：流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、セタノール、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、プロピレングリコール、エデト酸Na

## ■ 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

08 ®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10