

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

しっしん・かぶれに

アレギール®SK

アレギールSKの特徴

- しっしん、かぶれ、皮膚炎等によく効きます。
- 皮膚表面の患部で効果をあらわし、体内に吸収されると低活性になるアンテドラッグ・ステロイドのプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルを配合しています。
- よくのび、ベタつかないゲルクリームです。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

しっしん、かぶれ、皮膚炎、かゆみ、あせも、じんましん、虫さされ

使用法

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。
- (5) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。

成分・分量

本剤は、わずかに特異臭のある白色のクリーム剤で、1g中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	かゆみ、炎症をおさえます。
クロタミトン	50mg	かゆみをおさえます。

添加物：オクチルドデカノール、グリセリン、*dl*-ピロリドンカルボン酸Na、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤

〈成分・分量に関連する注意〉

塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、短時間のうちに消失します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

08 登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東興薬品工業株式会社
富山県中新川郡立山町辻20