

医薬品を正しく購入するための 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	カコナールこどもかぜシロップ（販売名：カコナールこどもシロップ a）
2	成分・分量	60mL 中 アセトアミノフェン 300mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、 グアヤコールスルホン酸カリウム 83.3mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回食後、場合によっては就寝前に服用して下さい。また、止むを得ない場合は約4時間の間隔をおいて、1日6回まで服用することができます。 3歳以上7歳未満：10mL 1歳以上3歳未満：7.5mL 6カ月以上1歳未満：6mL 3カ月以上6カ月未満：5mL 3カ月未満：服用しないで下さい。
4	効能・効果	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 （鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないで下さい。</p> <p>5. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人：高熱、排尿困難 (7) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障</p> <p>【2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。】 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。】 【この製品はお子さまの誤飲防止用の安全キャップ（チャイルド・レジスタントキャップ）を採用しています。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。