

指定医薬部外品

2包

開封口

02

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒100-8555 東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先：お客様相談室

電話 0120-3377-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.daiichisanjyo-hc.co.jp/



PR・PET



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒100-8555 東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先：お客様相談室

電話 0120-3377-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.daiichisanjyo-hc.co.jp/



4 987107 614605

使用期限は上、  
製造番号は下に表示

# 食べすぎ 飲みすぎ

胃もたれ・ムカムカに

## 第一三共胃腸細粒

スーッととけて効く

3つの消化酵素が効く

5つの生薬が効く



食前でも食後でも  
サツと飲みます

第一三共ヘルスケア

使用前にこの袋の説明書を必ずお読み下さい。

販売名：TS胃腸細粒 1g×2包

健胃消化薬 指定医薬部外品

### △使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
- (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
- (2) 2週間位服用しても症状がよくなるない場合

### ■効能・効果

もたれ(胃もたれ)、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、胃弱

### ■用法・用量 次の量を水又はお湯で服用して下さい。

成人(15歳以上)	1回 1包	1日3回、 食前又は食後に 服用して下さい。
11歳以上15歳未満	1回 2/3包	
8歳以上11歳未満	1回 1/2包	服用しないで下さい。
5歳以上8歳未満	1回 1/3包	
5歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

### ■成分・分量 3包(1包1g)中

●ウルソデオキシコール酸…60mg ●ピロガスタターゼ1000…30mg ●リパーゼAP6…45mg ●プロザイム6…15mg ●ウコン末…60mg ●ケイヒ末…180mg ●ウイキョウ末…180mg ●チョウジ末…55mg ●カンゾウ末…150mg 添加物：L-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、乳糖

### ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。