

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	第一三共胃腸薬コアブロック錠剤
2	成分・分量	9 錠中 セトラキサート塩酸塩 600mg、ロートエキス 3 倍散 90mg(ロートエキスとして 30mg)、 沈降炭酸カルシウム 1200mg、水酸化マグネシウム 300mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の 1 回量を 1 日 3 回、食間又は就寝前に服用して下さい。 成人(15 歳以上):3 錠 15 歳未満:服用しないで下さい。 (食間とは食事と食事の間で、前の食事から 2~3 時間後のことです)
4	効能・効果	胃もたれ、胃の痛み、飲みすぎ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、胸やけ、 げっぷ、はきけ(むかつき、嘔気、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、胃酸過多
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい。 フェニルケトン尿症の人 (本剤は L-フェニルアラニン化合物を含有するため) 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります) 次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人 排尿困難 (6)次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害、 血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、 血栓症を起こすおそれのある人 <その他の注意> 母乳が出にくくなる場合があります。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。