

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	第一三共胃腸薬〔錠剤〕
2	成分・分量	9錠中 タカチアスターゼ N1 150mg、リパーゼ AP12 60mg、 アカメガシワエキス 63mg（アカメガシワとして 504mg）、カンゾウ末 150mg、 ケイ酸アルミン酸マグネシウム 720mg、合成ヒドロタルサイト 300mg、 水酸化マグネシウム 600mg、ロートエキス 30mg、オウバク末 105mg、ケイヒ末 225mg、 ウイキョウ末 60mg、チョウジ末 30mg、ショウキョウ末 75mg、トメントール 9mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食後に服用して下さい。 15歳以上:3錠 11歳以上15歳未満:2錠 11歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	●もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振 ●胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ ●消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感 ●はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい。 透析療法を受けている人 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 4. 長期運用しないで下さい。 次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障 <その他の注意> 母乳が出にくくなる場合があります。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。