

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エクトール
2	成分・分量	6 カプセル中 アクリノール水和物 120mg、ベルベリン塩化物水和物（脱水物として）180mg、 ロートエキス 40mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	下記の1回量を1日3回、毎食後服用して下さい。 成人(15歳以上):2カプセル 8歳以上15歳未満:1カプセル 8歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、 腹痛を伴う下痢
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗り物酔い薬</p> <p>2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人</p> <p>(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人</p> <p>(4) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(5) 高齢者</p> <p>(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(7) 次の症状のある人 排尿困難</p> <p>(8) 次の診断を受けた人 心臓病、緑内障</p> <p><その他の注意> 母乳が出にくくなることがあります。</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。