

医薬品を正しく購入するための 説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エクトール赤玉
2	成分・分量	18錠中 アクリノール水和物 120mg、タンニン酸ベルベリン 180mg、 ウルソデオキシコール酸 30mg、 ゲンノショウコエキス末 250mg(原生薬として 1500mg)、 ロートエキス 3 倍散 135mg(ロートエキスとして 45mg) ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回を限度とし服用して下さい。 服用間隔は4時間以上おいて下さい。 成人(15歳以上):6錠 11歳以上 15歳未満:4錠 8歳以上 11歳未満:3錠 5歳以上 8歳未満:2錠 3歳以上 5歳未満:1錠 3歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、 腹痛を伴う下痢
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります) 次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人 (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人 (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (5) 高齢者 (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (7) 次の症状のある人 排尿困難 (8) 次の診断を受けた人 心臓病、緑内障 <その他の注意> 母乳が出にくくなる場合があります。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。