

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

オイラックス®PZ軟膏

オイラックスPZ軟膏の特徴

1. プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグとよばれる副腎皮質ホルモン(ステロイド)で、しっしん、皮膚炎、じんましん等の炎症をしずめます。
「アンテドラッグ」とは
皮膚表面の患部で効果をあらわし、吸収されると低活性になる特性をもつ薬剤です。
2. 鎮痒剤クロタミトンが、しっしん、かぶれ等に伴うかゆみをおさえます。
3. トコフェロール酢酸エステルが血行を促進し、治癒を促します。
4. 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールを配合しています。
5. 油性の基剤を使用していますので、ジクジクした症状からカサカサの皮膚まで幅広く使用できます。また、患部を保護するはたらきもあります。



使用上の注意

 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

* 効能・効果

しっしん、皮膚炎、じんましん、かぶれ、あせも、かゆみ、虫さされ

使用法


1日数回、適量を患部に塗擦して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。
- (5) 使用部位をラップフィルム等の通気性のわるいもので覆わないで下さい。

チューブの開け方

キャップを逆向きにし、中にある突起部をチューブの口に深く差込み、穴を開けて下さい。



成分・分量


本剤は、白色～淡黄色の軟膏で、100g中に次の成分を含有しています。

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g
クロタミトン	5.0g
トコフェール酢酸エステル	0.5g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
添加物：パラフィン、ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ソルビタンセスキオレイン酸エステル	

塗擦後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168