

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

オイラックス®デキサS軟膏

オイラックスデキサS軟膏の特徴

1. 副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルが、しっしん・かぶれ等の皮膚の炎症にすぐれた効果を発揮します。
2. 鎮痒成分クロタミトンが、しっしん・かぶれ等に伴うかゆみをおさえます。
3. 油性の基剤を使用していますので、ジユクジユクした症状からカサカサの皮膚まで幅広く使用できます。また、患部を保護するはたらきもあります。
4. イソプロピルメチルフェノールが殺菌作用を発揮します。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

しっしん、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん、皮膚炎、しもやけ

使用法

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本剤は、白色～淡黄色半透明の軟膏で、100g中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	皮膚の炎症をしずめます。
クロタミトン	5.0g	かゆみをおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血流を改善し、症状の回復を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用を発揮します。


添加物：ワセリン、サラシミツロウ、ステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ソルビタンセスキオレイン酸エステル

〈成分・分量に関連する注意〉

塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、短時間のうちに消失します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisanryo-hc.co.jp/>

®登録商標

 販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168