

- **トラフルBBチャージa**
- **トラフルBBチャージ**
- **新エバユースB26a**
- **新エバユースB26**

【使用上の注意】

使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 食前・食後にかかわらず、服用していただけます。
▶ **トラフルBBチャージa**
▶ **新エバユースB26a**
- (3) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【解 説】

1. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに服用を中止し、服用している製剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。

2. 一過性の軽い副作用としてあらわれることがあります。直ちに服用を中止する必要はありませんが、症状が持続したり増強する場合は、服用を中止して専門家に相談する必要があります。

● 下痢

リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル)、ビタミンC、ヨクイニンエキスにより、あらわれることがあります。

3. 本剤は、比較的作用が穏やかで、ある程度長期服用することによって、本来の効果が得られる性質の製剤です。効果のあらわれ方は、症状や服用する人の体質・体の状態などにより異なります。本剤を1カ月位服用しても効果がみられない場合には、他の疾患が原因の可能性も考えられるので、服用を中止し、専門家に相談する必要があります。

- (1) 共通事項解説〔8〕参照
- (2) 本剤の服用時間については、特に決まりはありません。
- (3) 共通事項解説〔9〕参照

- **トラフルBBチャージa**
- **トラフルBBチャージ**
- **新エバユースB26a**
- **新エバユースB26**

【使用上の注意】

【成分・分量に関連する注意】

1. 本剤に配合されているビタミンB₂酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。
2. 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
 - ▶ **トラフルBBチャージa**
 - ▶ **トラフルBBチャージ**
 - ▶ **新エバユースB26a**

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
5. ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
6. ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違えて服用しないよう注意して下さい。
7. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【解 説】

1. リボフラビン(ビタミンB₂)は黄色～だいだい黄色の結晶で、服用後に吸収され、その一部が尿中に排出されるので、尿が黄色くなることがあります。
 2. ビタミンCには還元作用があるので、還元作用や酸化作用を利用した尿や大便の検査(例えば尿糖検査や便潜血反応等)に対して、その検査を妨害することがあるため、注意が必要です。
1. 共通事項解説〔11〕参照
 2. 共通事項解説〔12〕参照
 3. 共通事項解説〔13〕参照
 4. 共通事項解説〔14〕参照
 5. 共通事項解説〔15〕参照
 6. 共通事項解説〔16〕参照
 7. 共通事項解説〔17〕参照