



●新黒丸a

【使用上の注意】	【解 説】
<p> 使用上の注意</p> <p> 相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p>	<p>1.</p> <p>(1) 共通事項解説〔4〕参照</p> <p>(2) 共通事項解説〔5〕参照</p> <p>2. 適応症として記載されている症状では、早ければ1～2日、遅くとも1～2週間位の服用により改善が見られるものですが、それ以上症状が長引く場合は他の疾患や合併症も考えられますので、服用を中止し、専門家に相談する必要があります。</p>
<p>【用法・用量に関連する注意】</p> <p>用法・用量を厳守して下さい。</p>	<p>共通事項解説〔8〕参照</p>
<p>【保管及び取扱い上の注意】</p> <p>1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。</p> <p>2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。</p> <p>3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)</p> <p>4. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。</p>	<p>1. 共通事項解説〔11〕参照</p> <p>2. 共通事項解説〔12〕参照</p> <p>3. 共通事項解説〔13〕参照</p> <p>4. 共通事項解説〔17〕参照</p>