

使用前にこの箱の説明文書を必ず
お読み下さい。また、必要な時に
読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 第2類医薬品 7枚入
ロキソニンEXテープ(7枚×1袋)

特
徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ【ロキソプロフェンナトリウム水和物】を8.1%配合。

さらに2つの有効成分を追加配合。

つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。

1日1回使用。こだわりの薄型設計で、
貼り心地やはがれにくさを追求。

【X】 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1.第一次人は使用しないで下さい。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたこと
がある人

(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用し
てせんそくを起こしたことがある人 (3)15歳未満の小児

2.第二次の部位には使用しないで下さい。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)しつしん、かぶれ、傷口
(3)みずもし・たむし等又は化膿している患部

3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。

4.連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的
におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用
を中止し、医師の診療を受けて下さい)

相談すること

1.第一次人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1)医師の治療を受けている人

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3)妊娠又は妊娠していると思われる人 (4)高齢者

(5)次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首
の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。

【用法・用量に関連する注意】

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、
痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ
使用して下さい。

(3)1日あたり4枚を超えて使用しないで下さい。

(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとてから使用して下さい。

(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の
小片を自宅として半日以上貼り、発赤・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状
が起きないことを確かめてから使用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない温湿の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ
替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックを
きちんと閉めて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた
製品は使用しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なる
べく早く使用して下さい。



使用上の注意

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかけられ、くしゃみ、どののかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。	下痢・軟便
4.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 (他の疾患の可能性があります)	

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	8.10g (無水物として7.14g)	炎症や痛みのもと【プロスタ グランジン】をおさえます。
トコフェロール酢酸 エステル	2.3g	患部の血行を促進し、痛みを やわらげます。
/メントール	3.5g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物：ステレン・イソブレン・ステレンブロッコリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングゼリンエスチル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラフィン、その他3成分 [1枚あたり(7cm×10cm)膏体量 0.7g]

【本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。】

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元 01®登録商標

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

リードケミカル株式会社

富山県富山市日侯77-3

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN



4 987107 631985