

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新ルル-K 細粒
2	成分・分量	3包(1包1.7g)中 麻黄エキス 566mg (マオウとして3396mg)、 ケイヒ末 270mg、 カンゾウエキス 188mg (カンゾウとして752mg)、 ニンジン軟エキス 100mg (ニンジンとして1100mg)、 クレマスチンフマル酸塩 1.34mg、 アセトアミノフェン 900mg、 無水カフェイン 90mg、 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg、 グアイフェネシン240mg、 ベンフォチアミン(ビタミンB ₁ 誘導體) 24mg 添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。 15歳以上:1包 11歳以上15歳未満:2/3包 7歳以上11歳未満:1/3包 7歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、のどの痛み、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、せき、たん、 関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 4. 服用前後は飲酒しないで下さい。 5. 長期連用しないで下さい。 次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人 (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の症状のある人 高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、 緑内障 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。