

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。 09

## 総合かぜ薬

### 第2類医薬品

発熱・さむけに  
のどの痛み

# 新ルル-K錠

### 新ルル-K錠の特徴

- 4種類の和漢薬と6種類の洋薬を配合した感冒薬です。
- 和漢薬と洋薬のダブル処方、特に発熱・悪寒（さむけ）・のどの痛みなどの症状にすぐれた効果を発揮します。
- かぜにより消耗した体力を回復させるため、ニンジンや持続性ビタミンB<sub>1</sub>誘導体のベンフォチアミンを配合しています。



### 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気等があらわれることがあります)

#### 4. 服用前後は飲酒しないで下さい。

#### 5. 長期連用しないで下さい。



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

#### \*\* (3) 授乳中の人

- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難



#### (7) 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、興奮、けいれん
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

□のかわき、眠気




4. 5~6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ■ 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、悪寒、頭痛、のどの痛み、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## ■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
15 歳 以 上	3錠 	3回 食後なるべく30分以内に 服用して下さい。
11歳以上15歳未満	2錠 	
7 歳以上11歳未満	1錠 	
7 歳 未 満	服用しないで下さい。	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## ■ 成分・分量

本剤は、淡黄色のフィルムコート錠で、9錠（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
麻黄エキス	566 mg (マオウとして3396mg)	発汗作用があり、熱を下げます。 また、せきをしずめます。
ケイヒ末	270 mg	おだやかに熱を下げます。
カンゾウエキス	188 mg (カンゾウとして752mg)	せきをしずめ、たんを切れやすくします。
ニンジン軟エキス	100 mg (ニンジンとして1100mg)	発熱やせきによる体力の消耗を回復 させます。
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、くしゃみ） をおさえます。
アセトアミノフェン	900 mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
無水カフェイン	90 mg	頭痛をやわらげます。
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	48 mg	せきをしずめます。
グアイフェネシン	240 mg	たんを切れやすくします。
ベンフォチアミン (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	24 mg	ベンフォチアミンは吸収のよいビタ ミンB <sub>1</sub> 誘導体で、かぜの時に消耗の 激しいビタミンB <sub>1</sub> をおぎないます。

添加物：ケイ酸Al、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、CMC、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ケイ酸Ca、ステアリン酸Mg、タルク、ヒプロメロース、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ステアリン酸、フマル酸、酸化チタン、三酸化鉄

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. めれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。また、めれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
5. ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
6. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

ルルについて詳しくは [www.lulu.jp](http://www.lulu.jp)

09®登録商標

 製造販売元  
**第一三共ヘルスケア株式会社**  
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>