

第3類医薬品

マキロン® かゆみどめパッチP 48枚入

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。

第3類医薬品

鎮痒消炎薬 マキロンかゆみどめパッチP

ノンステロイド

△ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと] (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ

☒ [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(面部)	色素沈着

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[効能・効果] 虫さされ、かゆみ、しもやけ

[成分・分量] 本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	分 量	はたらき
ジフェニヒドラミン	1.0g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
ブリチルレチン酸	0.5g	炎症をおさえます。(抗炎症剤)
クロタミン	5.0g	かゆみをおさえます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

添加物: メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、I-メントール
貼付後はてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

[使用法] パッチを台紙からはがし、1日数回面部に貼って下さい。
(使用法に関する注意)(1) 使用法を厳守して下さい。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
(3) 外用にのみ使用して下さい。
(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。
(5) 同じ場所に長時間使用しないで下さい。

[保管及び取り扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。
(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

[包装] 48枚(直径2.0cm×48枚)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

使用期限



MADE IN JAPAN

製造番号



4 987107 620514



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7

